



2012-TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI
(İlkbahar Dönemi)

22 NİSAN 2012 / PAZAR ÖĞLEDEN SONRA
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN
KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SALON NO. :

SIRA NO.:

Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

SORU KİTAPÇIK
NUMARASI :

**TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI**

Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamayı unutmayınız.

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.
2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon görevlisinin de hem soru kitapçığındaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

Adayın imzası:

Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

Salon görevlisinin imzası:

Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına doğru kodladığını onaylıyorum.

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta **Klinik Tıp Bilimleri Testi** bulunmaktadır.
2. Bu kitapçıkta test toplam 120 sorudan oluşmaktadır.
3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi **150 dakikadır (2,5 saat)**.
4. Bu kitapçıkta testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemi çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
6. **Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.** Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

1. Üretral dilatasyon uygulanacak bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığında endokardit profilaksisi uygulanmalıdır?

- A) İzole sekundum atrial septal defekt varsa
- B) Son 6 ayda koroner by-pass ameliyatı olmuşsa
- C) İntrakardiyak pacemaker varsa
- D) Biyoprotez kalp kapağı varsa
- E) Kapak yetersizliği olmayan mitral kapak prolapsusu varsa

2. Ciddi kalsifik aort darlığı olan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi, klinik tablonun aniden bozulmasına neden olur?

- A) Sinüs taşikardisi
- B) Atrial fibrilasyon
- C) Ventriküler prematüre sistoller
- D) Hipertansiyon
- E) Kronik anemi

3. Miyokart enfarktüsü komplikasyonu olarak ortaya çıkan sol ventrikül psödoanevrizması için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Rüptür olasılığı yüksektir.
- B) Tabanı geniş boyunludur.
- C) Anevrizma duvarını miyokart dokusu oluşturur.
- D) Arteryal emboliye neden olmazlar.
- E) Medikal tedavi genellikle yeterlidir.

4. Akut miyokart enfarktüsü seyrinde uygulanan tedavilerden, hayatta kalım üzerine etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trombolitik tedavi
- B) Aspirin
- C) Nitratlar
- D) ACE inhibitörleri
- E) Beta blokörler

5. Aşağıdakilerden hangisinde dissemine kandidiazis görülme olasılığı diğerlerine göre en düşüktür?

- A) Kanser kemoterapisi alan hastalar
- B) Nötropenik hastalar
- C) Uzun süreli sistemik steroid tedavisi alan hastalar
- D) Total parenteral beslenen hastalar
- E) Kronik mukokütanöz kandidiazisli hastalar

6. Öksürük ve balgam şikâyetleriyle başvuran 22 yaşındaki erkek hastanın hikâyesinden, çocuklukta ağır bir viral enfeksiyon geçirdiği ve ardından zatürre olduğu öğreniliyor. Posteroanterior akciğer grafisinde görülen bilateral lezyonlar için çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde dilate olmuş hava yolları, bronş duvar kalınlaşması ve "tree in bud" görünümü saptanıyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Astım
- B) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
- C) Bronşiektazi
- D) Akut bronşit
- E) Aspergilloma

7. Otuz beş yaşında kadın hasta; ateş, öksürük ve paslı balgam yakınması ile başvuruyor. Akciğer grafisinde konsolidasyon, hava bronkogramı görüntüsü olan ve sol sinusu kapalı hastanın, torakal ultrasonografisinde göğüs duvarından akciğeri ayıran 10 mm'den fazla serbest sıvı tespit ediliyor.

Bu hastada aşağıdaki invaziv girişimlerden hangisi, ilk olarak tercih edilmelidir?

- A) Torasentez
B) Tüp torakostomi
C) Tüp torakostomi ve streptokinaz uygulaması
D) Dekortikasyon
E) Torakoskopi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bruselloz tedavisinde kullanılan antibiyotiklerden biri değildir?

- A) Doksisiklin
B) Streptomisin
C) Rifampin
D) Trimetoprim-sulfametoksazol
E) Fusidik asit

9.

- I. 38°C'den fazla ateş
II. 3 yaşından küçük hasta
III. Ağrısız servikal lenfadenopati
IV. Konjunktivit
V. Eksüdatif tonsillofarenjit

Akut tonsillofarenjiti olan bir hastada yukarıdaki bulgulardan hangisinin varlığı, etkenin A grubu beta-hemolitik streptokok olma olasılığını güçlendirir?

- A) I ve III
B) I ve V
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) II, III ve V

10. Antitüberküloz tedavi alan bir hastada gelişen hepatotoksiteden sorumlu olma ihtimali en az olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Rifampisin
B) İzoniazid
C) Etambutol
D) Pirazinamid
E) Rifabutin

11. Hastane kökenli üriner sistem enfeksiyonu tanısı alan ve idrar kültüründe *Pseudomonas aeruginosa* üreyen hastada aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi ile tedaviye başlanabilir?

- A) Sefuroksim
B) Amoksisilin-klavulanat
C) Linezolid
D) Siprofloksasin
E) Ampisilin

12. Yirmi yaşında bir hasta çabuk yorulma ve solukluk nedeniyle hastaneye başvuruyor. Fizik muayenede subikter ve splenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin 9 g/dL, retikülosit %6 ve MCHC %37 bulunuyor.

Bu hastada tanı için aşağıdaki tetkiklerden hangisi öncelikle istenmelidir?

- A) Eritrosit ozmotik frajilite analizi
- B) Eritrosit sedimentasyon hızı
- C) Kemik iliği biyopsisi
- D) Serum ferritin düzeyi
- E) Hemoglobin elektroforezi

13. Aşağıdakilerden hangisi, edinsel hiperkoagülabilite sebeplerinden biridir?

- A) Aktive protein C rezistansı
- B) Protein S eksikliği
- C) Protein C eksikliği
- D) Disfonksiyonel trombomodulin
- E) Antifosfolipid antikor sendromu

14. Yüksek ateş şikâyetiyle başvuran 67 yaşındaki erkek hastada enfektif endokardit tanısı konulmuştur.

Kan kültürlerinde Streptococcus bovis üreyen bu hastada aşağıdaki kanserlerden hangisinin taranması gerekir?

- A) Meme kanseri
- B) Prostat kanseri
- C) Kolon kanseri
- D) Perikardiyal mezotelyom
- E) Akciğer kanseri

15. Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz?

- A) Erken menarş
- B) 30 yaş öncesi doğum yapma
- C) Geç menopoz
- D) Alkol kullanımı
- E) Ailesel faktörler

16. Aşağıdakilerden hangisi, ozmotik diyare nedenidir?

- A) Medüller tiroid kanseri
- B) Addison hastalığı
- C) Kolera enfeksiyonu
- D) Ağızdan Mg⁺² içeren laksatif kullanımı
- E) Kronik alkol kullanımı

17. Tarama amaçlı yapılan antikor testleri ile çölyak hastalığı şüphesi beliren ancak diyare ve kilo kaybı olmayan bir hastada, aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinin diğerlerinden önce oluşması beklenebilir?

- A) B₁₂ vitamini
- B) Albümin
- C) K vitamini
- D) E vitamini
- E) Demir

18. Sirotik bir hastada aşağıdaki faktörlerden hangisi hepatik koma gelişimi riskini artırmaz?

- A) Benzodiazepin kullanımı
- B) Hipokalemi
- C) Oral çinko alımı
- D) Asidoz
- E) Hipomagnezemi

19. Aşağıdakilerden hangisi, taşsız kolesistit için önemli bir risk faktörüdür?

- A) Genç yaşta olmak
- B) Kronik karaciğer hastalığı bulunması
- C) Primer biliyer siroz
- D) Diyabet
- E) α_1 -antitripsin eksikliği

20. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, akut interstisyel nefrite neden olarak akut böbrek yetmezliğine yol açabilir?

- A) Omeprazol
- B) Sidofovir
- C) Sisplatin
- D) Asetaminofen
- E) Pentamidin

21. Aşağıdaki metabolik asidoz nedenlerinden hangisinde anyon açığı normaldir?

- A) Diyabetik ketoasidoz
- B) Üremik asidoz
- C) Renal tübüler asidoz
- D) Laktik asidoz
- E) Salisilat intoksikasyonu

22. Böbrek nakli sonrası greftte en sık nüks eden renal hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Membranoproliferatif glomerülo nefrit tip II
- B) Membranöz glomerülo nefrit
- C) Sistemik lupus eritematozus nefriti
- D) Antiglomerül bazal membran hastalığı
- E) IgA nefropatisi

23. Aşağıdakilerden hangisi, metabolik sendrom tanısı için olması gereken kriterlerden biri değildir?

- A) Hipertrigliseridemi
- B) Düşük HDL kolesterol düzeyi
- C) Hiperglisemi
- D) Obezite
- E) Yüksek LDL kolesterol düzeyi

24. Altı yıl önce tip II diabetes mellitus tanısı almış 72 yaşında kadın hastanın laboratuvar incelemelerinde; açlık kan şekeri 160 mg/dL, tokluk kan şekeri 250 mg/dL ve hemoglobin A_{1c} değeri %8,2 olarak bulunuyor. Renal fonksiyonları normal ve kalp yetmezliği olmayan hastanın, osteoporozla bağlı gelişen kalça kırığı sebebiyle daha önce operasyon geçirdiği öğreniliyor.

Metformin 2 g/gün alan hastaya aşağıdaki oral antidiyabetiklerden hangisinin eklenmesi öncelikli olarak düşünülmez?

- A) α -glukozidaz inhibitörleri
- B) Tiazolidinedionlar
- C) Regüler insülin
- D) Sulfonilüreler
- E) DPP-IV inhibitörleri

25. Akromegali tanısını doğrulamada **en sık kullanılan ve en kabul görmüş test aşağıdakilerden hangisidir?**

(GH: büyüme hormonu, GHRH: büyüme hormonu releasing hormon)

- A) Serum IGF-1 düzeyinin ölçülmesi
- B) TRH stimülasyonuna GH yanıtı
- C) Sabah açlık GH düzeyinin ölçülmesi
- D) Oral glukoz tolerans testinin 1.-2. saatinde GH supresyonunun ölçülmesi
- E) GHRH ile GH stimülasyonu

26. Tarlada çalışırken baygın hâlde bulunarak acil servise getirilen bir çiftçinin ailesinden alınan öyküde, daha önce arı tarafından sokulduktan 10 dakika sonra boğazda ve dilde şişme, vücutta yaygın kızarıklık ve baş dönmesi geliştiği öğreniliyor.

Aşağıdaki tetkiklerden hangisi, bu hastanın anafilaktik şok geçirmekte olduğunu gösterir?

- A) Serum triptaz düzeyi
- B) Periferik kanda eozinofil sayısı
- C) Serum CRP düzeyi
- D) Serum kreatin fosfokinaz düzeyi
- E) Serum IgA düzeyi

27. Çocukluğundan beri sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları ve gastroenterit (giardiazis) tarif eden hastadan ayrıca son yıllarda allerjik rinit yakınmalarının da başladığı öğreniliyor.

Bu hastada ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Adrenal yetmezlik
- B) Hipotiroidi
- C) Kronik demir eksikliği anemisi
- D) Selektif IgA eksikliği
- E) Kronik hepatit B taşıyıcılığı

28. Osteoartritli hastalarda aşağıdaki bulgulardan hangisi **görülmez?**

- A) Direkt grafide osteofitler
- B) Heberden nodülleri
- C) Direkt grafide subkondral kistler
- D) Bouchard nodülleri
- E) Direkt grafide eklem aralığında genişleme

29. Femoral germe testi, hangi sinir köklerinin muayenesi için yapılır?

- A) D12, L1, L2 B) L2, L3, L4 C) L3, L4, L5
- D) L4, L5, S1 E) L5, S1, S2

30. Konuşmanın akıcı olduğu, anlamanın belirgin olarak korunduğu ancak tekrarlanmanın ağır derecede bozulduğu afazi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Broca B) Transkortikal duyusal
- C) İletim D) Wernicke
- E) Transkortikal motor

31. Multipl skleroz atağı sırasında görülme olasılığı en düşük klinik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Parezi B) Parestezi C) Diplopi
D) Ataksi E) Afazi

32. Aşağıdakilerden hangisi, spontan intraserebral kanamaların en sık rastlanan lokalizasyonudur?

- A) Putaminal B) Serebellar C) Pontin
D) Talamik E) Kaudat

33. Aşağıdaki bulgulardan hangisi, deliryum için tanı koydurucudur?

- A) Sanrı B) Amnezi
C) Apati D) Bilinç bulanıklığı
E) İnsomni

34. Yetmiş yedi yaşında bir hastanın öyküsünden 1 ay önce inme geçirdiği ve sol hemiparezisi olduğu öğreniliyor. Merkezi sinir sisteminde enfarkt saptanan hastada iki haftadır uykusuzluk, isteksizlik, keyifsizlik, ağlama hâlleri ve rehabilitasyon programına ilgisizlik olduğu gözleniyor.

Bu hastadaki ruhsal tablo aşağıdakilerden hangisine uyar?

- A) Anksiyete B) Manik bozukluk
C) Deliryum D) Demans
E) Depresyon

35. Rotavirus enfeksiyonlarının en sık görüldüğü yaş grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4 aydan küçük olanlar
B) 4 ay ile 2 yaş arasında olanlar
C) 2 yaş ile 4 yaş arasında olanlar
D) 5 yaş ile 7 yaş arasında olanlar
E) 8 yaşından büyük olanlar

36. Otuz altı yaşında günde bir paket sigara içen kadın hasta aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisini kesinlikle kullanmamalıdır?

- A) Bakırlı rahim içi araç
B) Kombine oral kontraseptif
C) Kondom
D) Levonorgestrel içeren rahim içi araç
E) Depo medroksiprogesteron asetat (DMPA)

37. Pulmoner tromboembolinin araştırılması amacıyla kullanılan bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi tetkiki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Santral pulmoner arterler içindeki pıhtıyı direkt olarak gösterir.
B) Emboli dışındaki nedenlerin tanısında da faydalıdır.
C) Spiral bilgisayarlı tomografi ile yapılır.
D) İntravenöz kontrast madde verilmeden yapılır.
E) Aynı seansta etiyoloji amaçlı olarak, alt ekstremiteden kesitler alınabilir.

38. Aşağıdakilerden hangisi, malign kemik tümörlerinin direkt radyolojik bulgularından biri değildir?

- A) Lezyon ile normal kemik arasında dar geçiş zonu
- B) Periost reaksiyonu
- C) Yumuşak doku şişliği
- D) Korteks bütünlüğünün bozulması
- E) Lezyonun konturlarında düzensizlik

39. "Hot-tub follikülit" etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Klebsiella pneumoniae
- B) Streptococcus pyogenes
- C) Pseudomonas aeruginosa
- D) Staphylococcus aureus
- E) Candida albicans

40. Aşağıdakilerden hangisi, uyuz tedavisinde topikal olarak kullanılmamaktadır?

- A) Permetrin
- B) Sülfür
- C) Benzil benzoat
- D) Krotamiton
- E) İvermektin

41. Hastalıkların kontrolü amacıyla asemptomatik ama hastalık açısından riskli kişi ya da grupların, ilgilenilen hastalığın erken tanı ve tedavisi amacıyla incelenmesine toplum taramaları denir.

Bu amaçla aşağıdaki hastalıklardan hangisi toplum taramaları için uygundur?

- A) Serviks kanseri
- B) Akut lösemi
- C) Behçet hastalığı
- D) Malign melanom
- E) Osteoartrit

42. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin eliminasyon programı yürütülmektedir?

- A) Tüberküloz
- B) Hepatit B
- C) Poliomiyelit
- D) Neonatal tetanoz
- E) Boğmaca

43. Aşağıdaki aşılarından hangisi, 15 aylık bir bebeğe önerilmez?

- A) Hepatit A aşısı
- B) Konjuge pnömokok aşısı
- C) Suçiçeği aşısı
- D) Hemofilus influenza tip b aşısı
- E) Rotavirus aşısı

44. **Nütrisyonel rikets bulgularından hangisi, erken infant döneminde fizyolojik bulgu kabul edilir?**

- A) Raşitik rozari
- B) Harrison oluğu
- C) Kraniotabes
- D) El bilek kemikleri metafizlerinde genişleme
- E) Varus deformitesi

45. Sağ gözünde kızarıklık ve ateş nedeni ile getirilen 6 aylık erkek bebeğin, yapılan fizik muayenesinde anterior üveit saptanıyor.

Bu bebekte ayırıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?

- A) Adenovirus enfeksiyonu
- B) Kawasaki hastalığı
- C) Juvenil idyopatik artrit
- D) Sarkoidoz
- E) İnflamatuvar bağırsak hastalığı

46. Yirmi üç aylık erkek çocuk, ateş ve yürürken hafif topalama yakınması ile getiriliyor. Fizik muayenede vücut sıcaklığı 38,4°C olarak bulunuyor. Sol dizinde şişlik ve pasif olarak sol dizi hareket ettirilmek istendiğinde direnç gösterip ağladığı gözleniyor. Sol diz eklemi tomografisinde eklem mesafesinde artma ve sıvı varlığı saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde beyaz küre sayısı: 18.400/mm³, eritrosit sedimentasyon hızı: 80 mm/saat bulunuyor.

Tüm aşıları yapılmış bu çocukta en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Streptococcus pneumoniae
- B) Candida albicans
- C) Haemophilus influenzae tip b
- D) Neisseria meningitidis
- E) Staphylococcus aureus

47. Üç hafta-4 yaş arasındaki çocuklarda, toplum kaynaklı pnömoninin en sık bakteriyel etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mycoplasma pneumoniae
- B) Haemophilus influenzae
- C) Staphylococcus aureus
- D) Streptococcus pneumoniae
- E) Chlamydia trachomatis

48. Yenidoğan hematolojik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Hemoglobin düzeyi yenidoğanın gebelik yaşı ile doğru orantılıdır.
- B) Term bir yenidoğanda kord kanı hemoglobin düzeyi 12-14 g/dL'dir.
- C) Fizyolojik anemi, term yenidoğanlarda yaklaşık 8-12 haftada ortaya çıkar.
- D) Prematürel anemisi genellikle 6. haftada ortaya çıkar.
- E) Kordun geç klemlenmesi aneminin önlenmesinde yararlı olabilir.

49. Yeni doğmuş bir bebek 5. dakikada değerlendirildiğinde; dudaklarının pembe, el ve ayaklarının mor, kalp hızının 80/dakika, öğürme refleksinin normal ve solunumunun yavaş-düzensiz olduğu, kol ve bacaklarını hafif fleksiyonda tuttuğu görülüyor.

Bu bebeğin 5. dakika Apgar skoru kaçtır?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8

50. Aşağıdaki maternal aktif enfeksiyonların hangisinde etken mikroorganizma, anne sütüne geçebilmesine rağmen emzirme ile yenidoğanda hastalığa **neden olmaz**?

- A) Mikobakterium tüberkülozis enfeksiyonu
- B) Grup B streptokok enfeksiyonu
- C) HIV enfeksiyonu
- D) Sitomegalovirus enfeksiyonu
- E) HTLV-1 enfeksiyonu

51. Üç yaşında erkek hasta solukluk nedeniyle hastaneye getiriliyor. Tam kan sayımında hemoglobinin: 9 g/dL, beyaz küre: 4800/mm³, trombosit: 250.000/mm³, ortalama eritrosit hacmi: 101 fL bulunuyor. Periferik kan yaymasında makroovalositoz, idrarda metilmalonik asit atılımının arttığı tespit ediliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kurşun intoksikasyonu
- B) Herediter ovalositoz
- C) B₁₂ vitamini eksikliği
- D) B₆ vitamini eksikliği
- E) B₁ vitamini eksikliği

52. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde sadece eritrosit serisinde yapım yetersizliği vardır?

- A) Fanconi aplastik anemisi
- B) Megaloblastik anemi
- C) Kostmann sendromu
- D) Diamond-Blackfan anemisi
- E) Orak hücreli anemi

53. Tümör lizis sendromu saptanan Hodgkin dışı lenfomalı bir çocukta ilk tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) Vinkristin infüzyonu
- B) İntravenöz hidrasyon ve sodyum bikarbonat
- C) Potasyum
- D) İnsülin
- E) Kalsiyum

54. Nöroblastomda aşağıdakilerden hangisi, yaşam açısından prognostik faktörlerden biri değildir?

- A) Evre
- B) Yaş
- C) N-myc amplifikasyonu
- D) Kemik metastazı
- E) Cinsiyet

55. Aşağıdakilerden hangisi, glomerüler hastalık oluşturmaz?

- A) Alport sendromu
- B) Sistemik lupus eritematozus
- C) Henoch-Schönlein purpurası
- D) IgA nefropatisi
- E) Bartter sendromu

56. Aşağıdakilerden hangisi, sebep olduğu akut böbrek yetmezliği tipi açısından diğerlerinden farklıdır?

- A) Masif kanama
- B) Kalp yetmezliği
- C) Hemolitik üremik sendrom
- D) Yanık
- E) Hipoalbuminemi

57. Lupus nefriti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İmmün kompleks nefritidir.
- B) Kompleman düzeyleri genellikle normaldir.
- C) ANA pozitifliği vardır.
- D) İmmünoşüpresif tedavi verilir.
- E) Lupus hastasının ilk başvurusu böbrek hastalığı ile olabilir.

58. Fallot tetralojisi nedeniyle izlenen bir çocuk acil servise aniden morarmasının arttığı, şiddetli ağladığı ve solunumunun hızlandığı yakınmasıyla getiriliyor. Fizik muayenede hastada şiddetli siyanoz fark ediliyor.

Bu hastaya aşağıdaki tedavilerden hangisi uygulanmaz?

- A) Diz-göğüs pozisyonuna getirme
- B) Oksijen
- C) Propranolol
- D) Morfin
- E) Dopamin

59. Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde pansistolik üfürüm duyulur?

- A) Atrial septal defekt
- B) Ventriküler septal defekt
- C) Patent duktus arteriozus
- D) Aort stenozu
- E) Pulmoner stenoz

60. Hipotiroidizm taramasında TSH yüksekliği saptanan bir bebekte, konjenital hipotiroidizm tanısı için aşağıdakilerden hangisi, öncelikli olarak istenmelidir?

- A) Serum T4 ve/veya serbest T4 düzeyi
- B) Serum T3 ve/veya serbest T3 düzeyi
- C) Tiroglobulin düzeyi
- D) Tiroid ultrasonografisi
- E) Tiroid sintigrafisi

61. Turner sendromunda aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi beklenmez?

- A) Boy kısalığı
- B) Gecikmiş puberte
- C) Hipertiroidi
- D) Aort koarktasyonu
- E) İskelet deformitesi

62. Çocuklarda primer peptik ülserin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nonsteroidal antiinflatuvar kullanımı
- B) Kısa bağırsak sendromu
- C) Mastositoz
- D) Zollinger-Ellison sendromu
- E) Helicobacter pylori enfeksiyonu

63. Portal hipertansiyona bağlı asiti olan bir çocukta tedavinin birinci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spironolakton verilmesi
- B) Tuz kısıtlaması
- C) Steroid kullanımı
- D) Sıvı kısıtlaması
- E) Geniş volümlü parasentez

64. Altı aylık bebek konvülsiyon geçirme şikâyetiyle hastaneye getiriliyor. Fizik muayenesinde ciltte depigmente lekeler saptanıyor.

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sturge-Weber sendromu
- B) Ataksi-telanjipektazi
- C) von Hippel-Lindau hastalığı
- D) Tuberoskleroz
- E) Nörofibromatoz

65. Absans epilepsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Beş yaştan önce nadirdir.
- B) Kız çocuklarında daha fazla görülür.
- C) Aura vardır.
- D) Genellikle birkaç saniye sürer.
- E) Postiktal bulgu yoktur.

66. Kistik fibrozisli hastaların akciğerinde sıklıkla kolonize olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pseudomonas aeruginosa
- B) B grubu streptokoklar
- C) A grubu streptokoklar
- D) Pneumocystis jirovecii
- E) Legionella pneumophila

67. Aşağıdakilerin hangisinde plevral sıvıda glukoz düzeyi düşük **değildir**?

- A) Malign efüzyon
- B) Ampiyem
- C) Tüberküloz
- D) Sistemik lupus eritematozus
- E) Nefrotik sendrom

68. Akçaağaç şurubu idrar hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Lösin, izölösin ve valin metabolizması bozukluğudur.
- B) Bazı tipleri tiamine cevap verir.
- C) İdrarda çemen kokusu ile karakterizedir.
- D) Bebek doğumda semptomatiktir.
- E) Ağır formunda tedavi uygulanmazsa ölüm kaçınılmazdır.

69. Öyküsünden özellikle sabah uandıktan sonra bilinç kaybı ve nöbetleri olduğu öğrenilen 3 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde karaciğer büyüklüğü ve "bebek yüzü" görünümü dikkat çekiyor. Laboratuvar incelemelerinde hipoglisemi, hipertrigliseridemi, hiperürisemi ve laktik asit yüksekliği saptanıyor.

Bu hasta için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Wilson hastalığı
- B) Glikojen depo hastalığı
- C) Üre döngüsü bozukluğu
- D) Fenilketonüri
- E) Peroksizomal hastalık

70. Aşağıdaki tetikleyicilerden hangisi, astımlılarda hava yollarındaki inflamasyonu artırmadan semptomların oluşmasına neden olur?

- A) Respiratuvar viral enfeksiyonlar
- B) Allerjenler
- C) Sigara dumanı
- D) Hava kirleticiler (ozon, sülfür dioksit vb.)
- E) Soğuk hava

71. Kronik idyopatik ürtiker ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Sistemik hastalık bulguları sıktır.
- B) Fiziksel ürtiker tipidir.
- C) Antitiroid antikor varlığı daha sıktır.
- D) Otolog deri testi negatiftir.
- E) Laringeal ödem sık rastlanan bir bulgudur.

72. Bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen 3 yaşında kız hastada nabız alınmıyor ve solunumun durduğu saptanıyor. Monitörize edildiğinde ventriküler fibrilasyon olduğu anlaşılıyor.

Hastanın kalbinin sinüs ritmine dönmesi için ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Defibrilasyon
- B) Kardiyoversiyon
- C) Lidokain verilmesi
- D) Amiodaron verilmesi
- E) Adenozin verilmesi

73. Papiller tiroid kanseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Erkeklerde daha sık görülür.
- B) TSH'ye bağımlı değildir.
- C) Genellikle multifokaldir.
- D) Uzak metastaz yapma olasılığı çok yüksektir.
- E) Her hastada tümöral lezyonun olduğu tarafa lobektomi yapmak yeterlidir.

74. Tanısı radyolojik olarak da doğrulanmış bir nekrotizan pankreatit olgusunda vücut sıcaklığı 39°C, kalp atım hızı: 104/dak ve beyaz küre sayısı: 5000/mm³ bulunuyor. Peripankreatik sıvıdan alınan örnekte iltihap olduğu ve oligüri geliştiği görülüyor.

Arteryal kan basıncı sıvı resusitasyonuna cevap veren bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu
- B) Bakteriyemi
- C) Sepsis
- D) Ciddi sepsis
- E) Septik şok

75. Retroperitoneal sarkomlar içinde en sık görülen aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gastrointestinal stromal tümör
- B) Liposarkom
- C) Fibrosarkom
- D) Rabdomiyosarkom
- E) Periferel sinir kılıfı tümörü

76. Aşağıdakilerden hangisinde Abdominal Kompartman Sendromu (ACS) beklenmez?

- A) Masif infüzyon/transfüzyon uygulanan septik hastalar
- B) İntraperitoneal/retroperitoneal kanamalı hastalar
- C) Periton boşluğunda ani sıvı/asit biriken hastalar
- D) Uzun süre mekanik ventilasyona bağlı kalan hastalar
- E) İntestinal obstrüksiyona bağlı bağırsak ödemi/distansiyonu olan hastalar

77. Etiğe ilkeci yaklaşım ışığında, sağlık hizmetini ilk başvuran kişinin alması gerektiğini savunan adalet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Denkleştirici adalet
- B) Eşitlikçi adalet
- C) Yararcı adalet
- D) Liyakatçı adalet
- E) Minimum etkinlikçi adalet

78. Aşağıdakilerden hangisi, parenteral beslenme endikasyonlarından biri değildir?

- A) Kısa bağırsak sendromu
- B) Beş günden daha uzun süre enteral beslenme yapılamayacak kritik hastalıklar
- C) Hemodinamik instabilite
- D) Yüksek debili enterokütanöz fistüller
- E) Malabsorpsiyon sendromu

79. Aşağıdaki tedavi metodlarından hangisinin, akalazyaya tedavisinde yeri yoktur?

- A) Balon dilatasyon
- B) Buji dilatasyon
- C) Medikal tedavi (Ca kanal blokörleri, nitroglicerine, vb.)
- D) Botulinum toksini enjeksiyonu
- E) Totale yakın özofajektomi ve özofagogastrostomi

80. Üç hafta önce gelişen akut pankreatit nedeniyle izlenmekte olan hastada hızlı bir seyirle ortaya çıkan karın üst kadranda ağrısı, ateş, lökositoz ve epigastriumun sol tarafına lokalize ele gelen bir kitle tespit ediliyor.

Bu hastada ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tekrarlayan akut pankreatit
- B) Apseleşen psödokist
- C) Akut taşlı kolesistit
- D) Akut gastrit
- E) Karaciğer sol lob apsisi

81. Nekrotik migratuvar eritem aşağıdaki endokrin pankreas tümörlerinden hangisinde görülür?

- A) İnsülinoma
- B) Gastrinoma
- C) Glukagonoma
- D) Somatostatinozma
- E) Pankreatik polipeptidoma

82. Persistan hiperparatiroidizmi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

- A) Paratiroidektomi sonrası hiperkalseminin düzelmemesi
- B) Paratiroidektomi sonrası hiperparatiroidizmin düzelmemesi
- C) Paratiroidektomi sonrası 6. aydan sonra hiperkalseminin ortaya çıkması
- D) Paratiroidektomi sonrası 6. aydan sonra hiperparatiroidinin ortaya çıkması
- E) Paratiroidektomi sonrası hiperkalsemi ve hiperparatiroidizmin düzelmemesi

83. Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini olumsuz yönde etkilemez?

- A) Demir eksikliği
- B) Hipoksi
- C) Lokal gerginlik
- D) Hipokalsemi
- E) Glukokortikoidler

84. Mide karsinomu nedeni ile gastrektomi yapılan hastada postoperatif birinci gün serum potasyum değerinin 2,2 mEq/L olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Potasyum açığı, en az saatte 50 mEq verilerek kapatılmalıdır.
- B) Santral venöz kateter yolu tercih edilmelidir.
- C) Hasta, kardiyak fonksiyonları açısından gözlem altında olmalıdır.
- D) Hastanın oligürik olmamasına dikkat edilmelidir.
- E) İnfüzyon tamamlandıktan 2 saat sonra serum potasyum seviyesi kontrol edilmelidir.

85. Aşağıdakilerden hangisi, travmaya sistemik yanıtta antiinflamatuar etki gösteren sitokinlerden biridir?

- A) IL-2
- B) IL-5
- C) IL-6
- D) IL-8
- E) IL-10

86. Şoktaki hastada uygulanan resusitasyonun hücresel düzeyde başarılı olup olmadığını ölçmede aşağıdaki parametrelerden hangisinin yeri yoktur?

- A) PaO₂
- B) Serum laktat düzeyi
- C) Baz açığı
- D) Santral venöz basınç
- E) Gastrik tonometri

87. Araç içi trafik kazası sonucu akut spinal kord yaralanması geçiren 25 yaşında bir kadında komplet motor kayıp olduğu belirleniyor.

Bu hastada kardiyovasküler sistemde aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenmez?

- A) Hipotansiyon
- B) Taşikardi
- C) Kalp ritim bozuklukları
- D) Kardiyak outputta azalma
- E) Periferik vasküler dirençte düşme

88. Duodenumun by-pass edildiği (Billroth II gastrektomi) veya çıkartıldığı (Whipple prosedürü) ameliyatlardan sonra aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinin gelişmesi beklenir?

- A) Demir
- B) D vitamini
- C) K vitamini
- D) Biotin
- E) Tiamin

89. Tomografide ve makroskopik incelemede santral fibröz skar görüntüsü karakteristik olan benign karaciğer tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hemanjiyom
- B) Adenom
- C) Fokal nodüler hiperplazi
- D) Mezenkimal hamartom
- E) Nodüler rejeneratif hiperplazi

90. Safra kesesinin infundibulum kısmına yerleşen bir taşın, ciddi perikolesistik inflamasyon sonucunda tıkanma sarılığına yol açtığı sendroma ne ad verilir?

- A) Murphy
- B) Mirizzi
- C) Courvoisier-terrier
- D) Fitz-Hugh-Curtis
- E) Cullen

91. Kolorektal kanser tanısına yönelik en güvenilir tarama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dışkıda gizli kan testi
- B) Sigmoidoskopi
- C) Bilgisayarlı tomografiyle çekilen kolon grafisi
- D) Çift kontrastlı kolon grafisi
- E) Kolonoskopi

92. Aşağıdakilerden hangisi, apandisit komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Periapendiküler apse
- B) Kanserleşme
- C) Jeneralize peritonit
- D) Perforasyon
- E) Plastron oluşması

93. Akut anal fissürün tanısı aşağıdakilerden hangisi ile konulur?

- A) Gözle muayene
- B) Rektal tuşe
- C) Anoskopi
- D) Sigmoidoskopi
- E) Kolonoskopi

94. Gelişmiş ülkelerde gastrointestinal lenfoma en sık aşağıdaki organların hangisinde izlenir?

- A) Mide B) Karaciğer C) Jejunum
D) Kolon E) Duodenum

95. Mamografideki lezyon nedeni ile meme biyopsisi yapılan kadın hastada aşağıdaki patolojik sonuçlardan hangisi yakın takibi gerektirir?

- A) Apokrin metaplazi B) Duktal ektazi
C) Atipik duktal hiperplazi D) İntraduktal papillom
E) Fibroadenom

96. Meme tümörü nedeni ile yapılan modifiye radikal mastektomi materyali aşağıdaki anatomik yapılardan hangisini İÇERMEZ?

- A) Meme başı ve areola kompleksi
B) Meme derisi
C) Memenin glandüler dokusu
D) Aksiller lenf nodülleri
E) Pektoralis majör kası

97. Aşağıdakilerden hangisi, adrenokortikal kanserin özelliklerinden biridir?

- A) Çapları <3 cm'dir.
B) %90 fonksiyon göstermezler.
C) En sık kortizol salgırlar.
D) Sadece erişkinlerde görülürler.
E) Tedavisi sadece laparoskopik adrenaektomidir.

98. Dudak yarığı deformitesi ile doğan bebeklerde ilk cerrahi girişim en erken ne zaman yapılmalıdır?

- A) 0-1 ay arasında B) 3-6 ay arasında
C) 9-12 ay arasında D) 13-16 ay arasında
E) 18 aydan sonra

99. Hidrozel tedavi yöntemlerinden birisi, hidrozel içindeki sıvının boşaltılıp yerine sklerozan madde vermektir.

Aşağıdaki hidrozel tiplerinden hangisinde sklerozan madde kullanılmaz?

- A) 2-3 cm çaplı hidrozelde
B) 4-5 cm çaplı hidrozelde
C) 6-7 cm çaplı hidrozelde
D) Konjenital hidrozelde
E) Çapı 7 cm'yi geçen hidrozelde

100. Üç saat önce humerus seviyesinde oluşan travmatik bir amputasyonda; yaranın temizlenmesi, yıkanması ve debridman sonrası replantasyon için hasta cerrahiye alınıyor.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi operasyonun ilk basamağını oluşturur?

- A) Kemiğin kısaltılması ve fiksasyonu
B) Fleksör ve ekstansör kasların tamiri
C) Brakial arter anastomozu
D) Sıra ile sinirlerin tamiri
E) Venöz yapıların anastomozu

101. İnce bağırsakların en sık malign tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gastrointestinal stromal tümör
- B) Leyomiyosarkom
- C) Adenokarsinom
- D) Lenfoma
- E) Anjiyosarkom

102. Uzun süreli intravenöz infüzyonda kullanıldığında adrenokortikal baskılanma sonucunda yoğun bakım hastalarında mortaliteyi artırmış olduğu bilinen intravenöz anesteziği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Etomidat
- B) Propofol
- C) Ketamin
- D) Tiopental
- E) Droperidol

103. Akciğer absesinde ilk seçilecek tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil perkütan drenaj
- B) Antibiyotik tedavisi
- C) Lobektomi
- D) Wedge rezeksiyonu
- E) Bronkoskopi

104. Aşağıdakilerden hangisi, kardiyak kapak replasmanına bağlı komplikasyonlardan biri değildir?

- A) Tromboembolizm
- B) Hemolitik anemi
- C) Subakut bakteriyel endokardit
- D) Mekanik yetmezlik
- E) Miyokart enfarktüsü

105. Kırk iki yaşında erkek hasta 3 yıldır sağ ağız köşesinde başlayan jacksonien nöbetler geçirmektedir.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Meningo-ensefalit
- B) İntrakranial yer kaplayan oluşum
- C) İdyopatik epilepsi
- D) Multipl skleroz
- E) Normal basınçlı hidrosefali

106. Gelişmiş ülkelerde 70 yaş üzeri geri dönüşü olmayan görme kaybının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Açık açılı glokom
- B) Diyabetik retinopati
- C) Yaşa bağlı makula dejenerasyonu
- D) Katarakt
- E) Santral retinal arter tıkanıklığı

107. Fetüste tanınabilen aşağıdaki hastalıklardan hangisinde, intrauterin cerrahinin yeri yoktur?

- A) Kistik adenomatooid malformasyon
- B) Posterior üretral valv
- C) Konjenital hidrotoraks
- D) Omfalosel
- E) Sakrokoksigeal teratom

108. KBB polikliniğine başvuran 55 yaşındaki kadın hastanın öyküsünden; 3-4 gündür dış kulak yolunda yanma ve ağrı olduğu, son 1 gündür ağızında kayma olduğu ve gözlerini kapatamadığı öğreniliyor.

Otolojik muayenesinde dış kulak yolunda veziküler lezyonlar saptanan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Herpes zoster otikus
- B) Fronkülozis
- C) Nekrotizan otitis eksterna
- D) Büllöz eksternal otitis
- E) Granüler eksternal otitis

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

- A) Subserozal
- B) Pedinküle subserozal
- C) İntramural
- D) Servikal
- E) Tip 0 submukozal

110. Endometriozis'in tıbbi tedavi seçenekleri içinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

- A) Danazol
- B) Oral kontraseptifler
- C) Aromataz inhibitörleri
- D) ACE inhibitörleri
- E) GnRH agonistleri

111. Kırk üç yaşında 3 doğum yapmış hastanın öyküsünden son yıllarda dismenore ve menoraji varlığı öğreniliyor. Yapılan pelvik muayenesinde uterus, yumuşak ve normalden iri alınıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Adenomyozis
- B) Korpus kanseri
- C) Premenstrüel sendrom
- D) Myoma uteri
- E) Endometrial polip

112. Aşağıdaki vajinitlerden hangisinin tedavisinde öncelikle lokal östrojenler kullanılır?

- A) Kandida vajiniti
- B) Bakteriyal vajinozis
- C) Trikomonas vajiniti
- D) Atrofik vajinit
- E) Deskuamatif inflamatuvar vajinit

113. Doğum sırasında oksipit anterior pozisyonunda gelen fetal başın en geniş transvers çapının pelvik girim düzlemini geçmesine ne ad verilir?

- A) Pelvik iniş
B) Ekstansiyon
C) Angajman
D) İç rotasyon
E) Prezentasyon

114. Otuz yedinci gebelik haftasında kan basıncı 170/110 mmHg ve 24 saatlik idrarda 5 g protein saptanan gebede en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bebeğin akciğer matürasyonu için betametazon 12 mg 2 doz uygulanıp son dozdan 24 saat sonra doğumun gerçekleştirilmesi
B) Antihipertansif tedavi verilerek hastanın takip edilmesi
C) Diüretik tedavi verilip hastanın takip edilmesi
D) Hastaya tokoliz uygulanması
E) Hastanın en kısa zamanda doğurtulması

115. Pregestasyonel diyabetik kadınlarda gebelik sırasında aşağıdakilerden hangisinin sıklığı normal popülasyona göre artış göstermez?

- A) İntrauterin gelişme geriliği
B) Fetal makrozomi
C) Abortus
D) Fetal down sendromu
E) Preeklampsi

116. Aşağıdakilerden hangisi, menstrüel siklusun 2.-4. günlerinde over rezervinin belirlenmesi için en az öneme sahiptir?

- A) Folikül stimüle edici hormon düzeyi
B) Lüteinize edici hormon düzeyi
C) Östradiol düzeyi
D) Antimüllerian hormon düzeyi
E) Antral folikül sayısı

117. Aşağıdakilerden hangisi, Sheehan sendromunun etiopatogenez ve klinik özelliklerinden biri değildir?

- A) Hipofiz bezinin postpartum nekrozu
B) Hipertansif atakların görülmesi
C) Sekonder hipotiroidizm
D) Görme alanında daralma
E) Laktasyonun kesilmesi ve amenore

118. Gastrointestinal traktus kanserlerinin overe metastazları histolojik olarak aşağıdaki epitelyal over tümörlerinin hangisinden ayırt edilemez?

- A) Müsinöz
B) Seröz
C) Endometrioid
D) Mezonefroid
E) Brenner

119. Serum alfa-fetoprotein (AFP) ve insan koryonik gonadotropin yüksekliđi bulunan germ hücreli over tümörü ařađıdakilerden hangisidir?

- A) Disgerminom
- B) Koryokarsinom
- C) Embriyonal karsinom
- D) Endodermal sinüs tümörü
- E) İmmatür teratom

120. Acil kontrasepsiyon amacıyla kullanılabilen ve başarı oranı en yüksek olan yöntem ařađıdakilerden hangisidir?

- A) Progesteron içeren üç aylık enjeksiyonlar
- B) Diyafram
- C) Tüp ligasyonu
- D) Vajinal ring
- E) Bakırlı rahim içi araç

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

- 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Sınava kalem, silgi, kalemıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.**
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi **150 dakikadır.** Sınav başladıktan sonra **ilk 110** ve **son 15** dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. **Bu süreler dışında, cevaplamaı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.**
3. **Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.**
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyararak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaları eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki "Soru kitapçık numaramı doğru kodladım." kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığındaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

22 NİSAN 2012
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İlkbahar Dönemi)
KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1. D | 31. E | 61. C | 91. E |
| 2. B | 32. A | 62. E | 92. B |
| 3. A | 33. D | 63. B | 93. A |
| 4. C | 34. E | 64. D | 94. A |
| 5. E | 35. B | 65. C | 95. C |
| 6. C | 36. B | 66. A | 96. E |
| 7. A | 37. D | 67. E | 97. C |
| 8. E | 38. A | 68. D | 98. B |
| 9. B | 39. C | 69. B | 99. D |
| 10. C | 40. E | 70. E | 100. A |
| 11. D | 41. A | 71. C | 101. C |
| 12. A | 42. D | 72. A | 102. A |
| 13. E | 43. E | 73. C | 103. B |
| 14. C | 44. C | 74. D | 104. E |
| 15. B | 45. A | 75. B | 105. B |
| 16. D | 46. E | 76. D | 106. C |
| 17. E | 47. D | 77. B | 107. D |
| 18. C | 48. B | 78. C | 108. A |
| 19. D | 49. C | 79. E | 109. E |
| 20. A | 50. A | 80. B | 110. D |
| 21. C | 51. C | 81. C | 111. A |
| 22. A | 52. D | 82. A | 112. D |
| 23. E | 53. B | 83. D | 113. C |
| 24. B | 54. E | 84. A | 114. E |
| 25. D | 55. E | 85. E | 115. D |
| 26. A | 56. C | 86. D | 116. B |
| 27. D | 57. B | 87. B | 117. B |
| 28. E | 58. E | 88. A | 118. A |
| 29. B | 59. B | 89. C | 119. C |
| 30. C | 60. A | 90. B | 120. E |