



2012-TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI
(Sonbahar Dönemi)

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

9 EYLÜL 2012 / PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SALON NO. :

SIRA NO.:

Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

SORU KİTAPÇIK
NUMARASI :

**TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI**

Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamayı unutmayınız.

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.
2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon görevlisinin de hem soru kitapçığındaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

Adayın imzası:

Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

Salon görevlisinin imzası:

Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına doğru kodladığını onaylıyorum.

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta **Klinik Tıp Bilimleri Testi** bulunmaktadır.
2. Bu kitapçıkta test toplam **120 sorudan** oluşmaktadır.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi **150 dakikadır (2,5 saat)**.
4. Bu kitapçıkta testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemi çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
6. **Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.** Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

1. Akut miyokardit ayırıcı tanısında aşağıdaki tanı araçlarından hangisinin duyarlılığı en yüksektir?

- A) EKG
- B) Troponin
- C) Ekokardiyografi
- D) Kardiyak manyetik rezonans
- E) Kreatin kinaz

2. Prinzmetal varyant anginalı hastalarda en hassas provokasyon testi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ergonovin testi
- B) Dopamin testi
- C) Serotonin testi
- D) Hiperventilasyon
- E) Soğuk presör testi

3. İdyopatik pulmoner hipertansiyonu olan bir hastanın "akut vazodilatör testi" pozitif ise aşağıdaki tedavilerden hangisi ilk seçenek olarak başlanmalıdır?

- A) Sildenafil
- B) Bosentan
- C) Epoprostenol
- D) Nitrik oksit
- E) Nifedipin

4. On sekiz yaşında bir hasta koşu yaparken ani ve kısa süreli senkop geçiriyor. Daha önce hiçbir yakınması olmayan hastanın öyküsünden amcasının futbol oynarken aniden öldüğü öğreniliyor. Fizik muayenesinde kan basıncı: 140/60 mmHg olarak bulunuyor. Kardiyak muayenede tüm prekordiyumda apekse yayılım gösteren 3°/6° kaba sistolik üfürüm duyuluyor ve apekte palpabl S4 hissediliyor. EKG'sinde sol ventrikül hipertrofisini gösteren voltaj artışı, lateral prekordiyal derivasyonlarda ST-T değişiklikleri, derin ve dar Q dalgaları saptanıyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipertrofik kardiyomiyopati
- B) Brugada sendromu
- C) Restriktif kardiyomiyopati
- D) Akut miyokart enfarktüsü
- E) Dilate kardiyomiyopati

5. Üç gün önce eklem ağrıları ve yüksek ateş başlayan hastada eozinofili, steril piyüri ve akut böbrek hasarı saptanıyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sepsisle ilişkili akut böbrek hasarı
- B) İnterstisyel nefrit
- C) Radyokontrast nefropatisi
- D) Rabdomiyoliz
- E) Prerenal azotemi

6. Aşağıdakilerden hangisi akut ve kronik böbrek yetmezliği ayırımında kullanılmaz?

- A) Nöropati ve ektojik kalsifikasyonların varlığı
- B) BUN / Kreatinin oranının 20'nin üstünde olması
- C) Böbrek boyutları
- D) Band keratopati varlığı
- E) Geçmiş döneme ait böbrek fonksiyon testleri

7. Karın şişliği ile başvuran ve asit saptanan bir hastaya yaklaşım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Öncelikle boşaltıcı parasentez ile hasta rahatlatılmıdır.
- B) Serum asit albümin gradienti 1,1'den küçük ise öncelikle portal hipertansiyon düşünülmelidir.
- C) Portal hipertansif tip asit tedavisinde günlük tuz alımı 10 g olacak şekilde düzenlenmelidir.
- D) Spironolakton 100-200 mg/gün ile diüretik tedavisine başlanmalıdır.
- E) İlk olarak tiazid grubu diüretikler ilave edilmelidir.

8. Kronik diyaresi olan bir hastada dermatitis herpetiformis saptanırsa aşağıdaki tetkiklerden hangisi tanıya varmada yardımcıdır?

- A) Kolonoskopi
- B) Bilgisayarlı tomografi enterografi
- C) İdrarda 5-hidroksi indol asetik asit bakılması
- D) Serum gastrin ölçümü
- E) Antiendomisyum antikor testi

9. Aşağıdaki bulgulardan hangisi hemakromatozis tanısı konulan bir hastada demir deplesyonu sağlamak için yapılan flebotomilere iyi yanıt vermez?

- A) Diyabet
- B) Kalp yetmezliği
- C) Artropati
- D) Cilt bulguları
- E) Karaciğer fonksiyon testleri

10. Kronik alkol kullanımı olan bir hasta hematemez ve melena ile acile başvuruyor. Hastanın öyküsünden kanama öncesinde tekrarlayan kusma ve öğürmeleri olduğu öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede kronik karaciğer hastalığı bulguları saptanmıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Peptik ülser hastalığı
- B) Eroziv gastrit
- C) Mallory-Weiss yırtığı
- D) Dieulafoy lezyonu
- E) Eroziv özofajit

11. 2008 Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre aşağıdakilerden hangisi polisitemia vera tanısında kullanılmaz?

- A) Hemoglobin miktarı
- B) JAK2V617F mutasyonu
- C) Serum eritropoietin düzeyi
- D) Splenomegali
- E) Kemik iliğinde her üç seride artmış proliferasyon

12. Elli dört yaşında erkek hasta solukluk nedeniyle hastaneye başvuruyor. Fizik muayenede subikter saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 8,2 g/dL, lökosit sayısı 4120/mm³, trombosit sayısı 138.000/mm³ ve ortalama eritrosit hacmi 117 fL olarak bulunuyor.

Bu hastanın ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi yardımcı olmaz?

- A) Serum laktat dehidrogenaz düzeyi
- B) Retikülosit sayımı
- C) İdrarda ürobilinojen tayini
- D) Serum folik asit ve B₁₂ vitamini düzeyi
- E) Serum ferritin düzeyi

13. Meme kanseri tanısıyla bir hafta önce adjuvan kemoterapi almış bir kadın hasta febril nötropeni nedeniyle başvurmuştur.

Bu hastaya aşağıdaki durumlardan hangisinde ayaktan antibiyotik tedavisi önerilebilir?

- A) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı öyküsü
- B) Yaşının 60'dan küçük olması
- C) Hipotansiyon
- D) Genel durum bozukluğu
- E) Dehidratasyon varlığı

14. Aşağıdaki tümör belirteçlerinden hangisi ameliyat edilmiş kolon kanserinde hastalık nüksünü radyolojik yöntemlerden daha erken belirlemede kullanılabilir?

- A) CEA
- B) CA 125
- C) CA 15-3
- D) CA 19-9
- E) Alfa fetoprotein

15. Aşağıdakilerden hangisi Ailesel Akdeniz Ateşinde görülen bir cilt bulgusudur?

- A) Pyoderma gangrenozum
- B) Eritema nodozum
- C) Erizipel benzeri eritem
- D) Follikülit
- E) Eritema migrans

16. Yirmi sekiz yaşında kadın hasta, el bilekleri ve parmak eklemlerinde 6 aydan beri devam eden ağrı ve şişlik yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden 6 yıl önce romatoid artrit tanısı aldığı ve metotreksat ile 4 mg/gün metil prednizolon tedavisi başlandığı öğreniliyor. Altı yıl önceki hematolojik incelemeleri normal olan hastanın şimdiki hematolojik incelemesinde lökosit sayısı $2100/mm^3$, %82 lenfosit ve %16 polimorfonükleer lökosit olarak bulunuyor.

Bu hastadaki miyelosupresyona aşağıdakilerden hangisi neden olmaz?

- A) Sistemik lupus eritematozus ile birliktelik
- B) Amiloidoz
- C) Metotreksat toksisitesi
- D) Uzun süre kortikosteroid kullanımı
- E) Felty sendromu

17. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner emboli için risk faktörlerinden biri değildir?

- A) Öncesinde venöz tromboembolizm varlığı
- B) Disfibrinojenemi
- C) Antifosfolipid antikor sendromu
- D) Behçet hastalığı
- E) Hiperkalsemi

18. Kırk yaşında kadın hasta hâlsizlik, kaşıntı, geniz akıntısı ve nefes darlığı şikâyetleriyle başvuruyor. Öyküsünden 5 yıl önce astım tanısı aldığı ve inhaler bronkodilatör kullandığı öğreniliyor. İki yıl önce gastrointestinal sistem kanaması geçirdiği ve bir yıl önce de geçirdiği baygınlık sonrası yapılan incelemede A-V blok tespit edildiği öğreniliyor. Fizik muayenede ciltte gözlemlenen nodüllerden alınan biyopside eozinofilik vaskülit saptanıyor. Yapılan tam kan sayımında mutlak eozinofil sayısı $2000/mm^3$ ve posteroanterior akciğer grafisinde parankimal opasiteler tespit ediliyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Wegener granülomatozu
- B) Mikroskopik polianjiit
- C) Churg-Strauss sendromu
- D) Sarkoidoz
- E) Goodpasture sendromu

19. Aşağıdakilerden hangisi astım tedavisinde kullanılan "kontrol edici" ilaçlardan biri değildir?

- A) Uzun etkili antikolinerjik
- B) İnhaler kortikosteroid
- C) Lökotrien reseptör antagonisti
- D) Kromolin sodyum
- E) Sistemik kortikosteroidler

20. Yirmi beş yaşında kadın hasta baş ağrısı, ateş, hâlsizlik, iştahsızlık ve yaygın kas ağrıları şikâyetleri ile başvuruyor. Burun ve şiddetli vajinal kanaması olan hastanın öyküsünden 10 gün önce kene tarafından ısırıldığı öğreniliyor.

Aşağıdaki testlerden hangisi bu hastada sık saptanan laboratuvar bulguları arasında değildir?

- A) Trombositopeni
- B) Erken dönemde lökositoz
- C) Karaciğer enzim yüksekliği
- D) Laktat dehidrogenaz yüksekliği
- E) Kreatinin fosfokinaz yüksekliği

21. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan, 45 yaşında hayvancılıkla uğraşan bir hasta son bir aydır devam eden ateş, eklem ağrıları, gece terlemeleri, iştahsızlık ve hâlsizlik yakınmalarıyla başvuruyor. Yapılan fizik muayenede hepatosplenomegali ve radyolojik incelemelerde sakroileitis tespit ediliyor.

Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz?

- A) Tetrasiklin
- B) Amoksisilin / klavulanat
- C) Trimetoprim-sulfametoksazol
- D) Rifampisin
- E) Siprofloksasin

22. **Aşağıdakilerden hangisi sistemik inflamatuvar yanıt sendromu kriterlerinden biri değildir?**

- A) Lökositoz ($>12.000/mm^3$)
- B) Lökositopeni ($<4000/mm^3$)
- C) Taşikardi
- D) Hipotermi
- E) Bradipne

23. **Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitus'un mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarının oluşum mekanizmalarından biri değildir?**

- A) Glikolitik yolak aktivitesinde artış
- B) Polyol yolağı aktivitesinde artış
- C) İntraselüler ileri glikasyon son ürünlerinde artış
- D) Protein kinaz C aktivitesinde artış
- E) Heksozamin yolağı aktivitesinde artış

24.

- I. Oftalmopati
- II. Radyoaktif iyot tutulum yüksekliği
- III. Serum TSH düzeyinin baskılanması
- IV. Serum serbest T3 ve serbest T4 yüksekliği
- V. TSH reseptör antikoru varlığı

Graves hastalığının subakut granümatöz tiroiditten (De Quervain) ayırt edilmesini sağlayan özellikler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) I ve IV
- B) II ve III
- C) III ve V
- D) I, II ve V
- E) II, III ve IV

25. Aşağıdakilerden hangisi feokromositoma düşünülen bir hastada tanıyı destekleyen bir bulgu değildir?

- A) İlaçla indüklenmemiş postural hipotansiyon varlığı
- B) Kan basıncının ataklar hâlinde yükselmesi
- C) İlaçla indüklenmemiş hipopotasemi varlığı
- D) EKG'de sinüs taşikardisi
- E) Kısa süreli öyküye rağmen hedef organ hasarı bulgularının varlığı

26. Ülkemizde bildiri zorunlu olan bulaşıcı hastalıklardan bazıları sadece seçilmiş sağlık merkezlerinden bildirilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer alan hastalıklardan biridir?

- A) Sıtma
- B) Difteri
- C) Tifüs
- D) Tüberküloz
- E) İnfluenza

27. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi sağlıkta "primer koruma" kapsamında yer alır?

- A) Kızamık aşısı
- B) Bronkoskopi
- C) Cerrahi eksplorasyon
- D) Pap smear incelemesi
- E) ELISA testi

28. Elli yaşında obez bir hasta, sağ alt ekstremitede uyluğun ön ve yan yüzünde uyuşukluk, yanma hissi ve karıncalanma yakınmalarıyla başvuruyor.

Kas gücü muayenesi ve derin tendon refleksi normal saptanan hastada, olası lezyon aşağıdaki sinirlerden hangisindedir?

- A) N. obturatorius
- B) N. ilioinguinalis
- C) N. cutaneus femoris lateralis
- D) N. tibialis posterior
- E) N. fibularis communis

29. Alzheimer hastalığında ilk etkilenen kognitif fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Praksi
B) Dikkat
C) Gnozi
D) Yakın hafıza
E) Konuşma

30. Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi bel ağrısı kaynağı olamaz?

- A) Anterior longitudinal ligament
B) Nukleus pulposus
C) Sinir kökü
D) Kas ve fasya
E) Zigapofizyal eklem

31. Yumuşak dokularda oluşan yapışıklık, kontraktür veya skar nedeniyle eklem hareketlerinde kısıtlılık meydana gelmiş bir hastaya aşağıdaki egzersiz tiplerinden hangisi önerilmelidir?

- A) Güçlendirme egzersizleri
B) Germe egzersizleri
C) Denge ve koordinasyon egzersizleri
D) Aerobik egzersizler
E) İzokinetik egzersizler

32. Aşağıdakilerden hangisi alopesi areata'da kötü prognoz göstergelerinden biri değildir?

- A) Aile öyküsü
B) Tırnak tutulumu
C) İleri yaşta ortaya çıkması
D) Çok sayıda alopesik plak varlığı
E) Ofiazis

33. Allerjik kontakt dermatitte etkenin saptanması amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

- A) Yama testi
B) Delme testi
C) Tzanck testi
D) Radioallergosorbent test (RAST)
E) Serum total IgE değeri

34. Bir hastanın ayakta direkt karın grafisinde ters U şeklinde dilate bağırsak izlenmiştir.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ülseratif kolit
B) Rektum tümörü
C) Akut divertikülit
D) Sigmoid volvulus
E) Pnömoeritoneum

35. İskelet sistemi patolojilerinin görüntülenmesinde ilk başvurulacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Manyetik rezonans görüntüleme
- B) Direkt grafi
- C) Sintigrafi
- D) Bilgisayarlı tomografi
- E) Artrografi

36. Annede doğum sonrası en sık ortaya çıkan ruhsal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Postpartum psikoz
- B) Postpartum yas
- C) Postpartum depresyon
- D) Postpartum mani
- E) Bebek hüznü

37. Aşağıdakilerin hangisinde negatif tip şizofrenideki temel bulgular verilmiştir?

- A) Apati, anerji
- B) Sanrı, varsanı
- C) Sirkumstansiyalite, tanjansiyalite
- D) Garip ve dezorganize davranışlar
- E) Enkohorans, dezoryantasyon

38. Zehirlenme tedavisiyle ilgili aşağıdaki toksik madde-antidot eşleştirmelerinden hangisi uygun değildir?

- A) Cıva – Dimerkaprol
- B) Heparin – Protamin sülfat
- C) Asetaminofen – N-Asetil sistein
- D) Bakır – Deferoksamin
- E) Kurşun – Kalsiyum disodyum EDTA

39. Aşağıdakilerden hangisi rabdomiyoliz nedenleri arasında değildir?

- A) Malign hipertermi
- B) Elektrik çarpması
- C) Hiperalbuminemi
- D) Yanıklar
- E) Ağır egzersiz

40. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayla beraber böbreklerde ortaya çıkan değişikliklerden biri değildir?

- A) Böbrek boyutlarının artması
- B) Glomerüler filtrasyonun azalması
- C) Glomerülosklerozun artması
- D) Böbrek kan akımının azalması
- E) İdrarı konsantre etme yeteneğinin bozulması

41. Bir hastalıkla ilgili tarama testi yapılabilmesi için sağlanması gerekli koşullar göz önüne alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İlgili hastalık, ciddi bir sağlık sorunu olmalıdır.
- B) İlgili hastalık, presemptomatik evresi olmayan bir hastalık olmalıdır.
- C) Tarama testi ve takip eden tedavi, toplum tarafından kabul edilebilir olmalıdır.
- D) Tarama testinin duyarlılığı ve özgüllüğü kabul edilebilir düzeyde olmalıdır.
- E) Tarama testi ve takip eden tedavi maliyet-etkin olmalıdır.

42. Yirmi bir yaşında bir öğrenci evinde saat 17.00'de yüzükoyun yatar pozisyonda ölü bulunmuştur. Gece morg buzdolabında bekletildikten sonra saat 10.00'da yapılan otopsisinde ölü lekelerinin açık kırmızı renkte ve sırtta, bası görmeyen yerlerde olduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Bulduğunda ölümünün üzerinden 10 saatten az olmuştur.
- B) Siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabilir.
- C) Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabilir.
- D) Potasyum klorat zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabilir.
- E) Soğukta bekleme nedeniyle ölü lekelerinin rengi açılmış olabilir.

43. Maternal eklampsi ve koryoamnionit nedeniyle acil olarak sezaryen ile doğurtulan bir yenidoğanın gebelik yaşı 28 hafta, doğum ağırlığı ise 1000 gramdır. Bebeğin doğumda 1. dakika Apgar skoru üç, 5. dakika Apgar skoru beş olarak belirleniyor.

Aşağıdaki faktörlerden hangisi bu yenidoğanın Apgar skorunun düşük olmasını açıklamaz?

- A) Anneye magnezyum sülfat verilmesi
- B) Anneye narkotik analjezik verilmesi
- C) Prematürite
- D) Bebeğindeki olası konjenital pnömoni ve sepsis
- E) Anneye intravenöz sıvı verilmesi

44. Kızamıkta ölüme en sık yol açan komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Otitis media
- B) Pnömoni
- C) Subakut sklerozan panensefalit
- D) Sinüzit
- E) Miyokardit

45. Otoimmün hepatit tanısı alan bir çocuk hastanın tedavisinde ilk seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kortikosteroid
- B) Ursodeoksikolik asit
- C) Azotiopürin
- D) 6-merkaptopürin
- E) Takrolimus

46. Sistemik lupus eritematozuslu bir annenin bebeğinde aşağıdakilerden hangisi görülmaz?

- A) Konjenital kalp bloğu
- B) Deri lezyonları
- C) Hepatit
- D) Trombositopeni
- E) Hipokalsemi

47. Ailevi Akdeniz Ateşi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Otozomal dominant geçişlidir.
- B) Klinik bulgular genellikle 15 yaşından sonra başlar.
- C) Hastalar artrit ile başvurabilir.
- D) Kolşisin 15 yaşına kadar verilir.
- E) Kolşisin, amiloidoz gelişme riskini etkilemez.

48. Nefrotik sendrom tanısı ile izlenen üç yaşında kız çocuk yüksek ateş ve karın ağrısı yakınmalarıyla getiriliyor. Fizik muayenede ateşinin 38,3 °C, nabzının 118/dakika ve solunum sayısının 26/dakika olduğu ve karında distansiyon ile yaygın hassasiyet saptanıyor. Yapılan laboratuvar incelemelerinde beyaz küre sayısı 18.300/mm³, periferik yaymada %80 polimorfonükleer lökosit ve sola kayma saptanıyor. Abdominal ultrasonografide periton boşluğunda serbest sıvı olduğu tespit ediliyor.

Bu hastadaki en olası hastalık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Grup B streptokok
- B) Streptococcus pneumoniae
- C) Escherichia coli
- D) Candida albicans
- E) Klebsiella pneumoniae

49. Birinci kalp sesi ile başlayan ve tüm sistol boyunca devam eden üfürüm aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pansistolik üfürüm
- B) Sistolik ejeksiyon üfürümü
- C) Devamlı üfürüm
- D) Diyastolik üfürüm
- E) "To-and-fro" üfürümü

50. Deride atopik dermatit ve kanda eozinofili saptanan hastada ayırıcı tanı için aşağıdaki incelemelerden hangisinin öncelikle yapılmasına gerek yoktur?

- A) Total IgE
- B) Alerjen spesifik IgE
- C) Kantitatif immünoglobulinler
- D) Kreatinin
- E) Trombosit sayısı

51. Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin akciğer komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Atelektazi
- B) Hemoptizi
- C) Reaktif hava yolu hastalığı
- D) Alerjik bronkopulmoner aspergilloz
- E) Bronşiolitis obliterans

52. Demir eksikliği anemisinde aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi görülmez?

- A) Serum demir düzeyinde azalma
- B) Serum demir bağlama kapasitesinde artma
- C) Transferrin saturasyonunda artma
- D) Serum ferritin düzeyinde azalma
- E) Eritrosit sayısında azalma

53. Hemofili A tanısı almış bir çocukta aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

- A) Kanama zamanının uzaması
- B) Aktive olmuş PTT'nin uzaması
- C) von Willebrand antijeni düzeyinin normal olması
- D) Faktör VIII düzeyinin düşük olması
- E) Protrombin zamanının normal olması

54. Eritroblastosis fetaliste aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?

- A) Ağır anemi
- B) Kardiyomegali
- C) Kemik iliğinde eritropoietik hipoplazi
- D) Dolaşım kollapsı
- E) Hepatosplenomegali

55. Çocuklarda total vücut suyunda azalma olan hiponatremik durum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nefrotik sendrom
- B) Serebral tuz kaybı
- C) Kalp yetmezliği
- D) Siroz
- E) Uygunsuz ADH sendromu

56. Aşağıdakilerden hangisi diyabetik ketoasidoz tedavisinde öncelikle yapılmalıdır?

- A) Kalsiyum verilmesi
- B) Fosfat verilmesi
- C) Bikarbonat verilmesi
- D) Rehidratasyon
- E) Mannitol verilmesi

57. Aşağıdakilerin hangisi geniş atrial septal defektin bulgularından biri değildir?

- A) İkinci kalp sesinde sabit çiftleşme
- B) Sol sternal kenarda sistolik ejeksiyon üfürümü
- C) Sol alt sternal kenarda middiyastolik üfürüm
- D) EKG'de sağ ventriküler kondüksiyon gecikmesi
- E) Pulmoner konüste çöküklük

58. Çocukluk döneminde akciğer dışı tüberkülozun en sık görülen şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tüberküloz menenjit
- B) Renal tüberküloz
- C) Tüberküloz lenfadenit
- D) Tüberküloz peritonit
- E) Tüberküloz perikardit

59. Çölyak hastalığı için en güvenilir tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnce bağırsak biyopsisi
- B) HLA doku tiplendirmesi
- C) Antiendomisyum antikor IgA
- D) Antigliadin antikor IgG
- E) Antigliadin antikor IgA

60. Çocuklarda tulareminin en sık görülen klinik şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pnömoni
- B) Ülseroglandüler
- C) Orofaringeal
- D) Oküloglandüler
- E) Tifoidal

61. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yenidoğanda nekrotizan enterokolit riskini azaltmada etkisizdir?

- A) Prematüreliliğin önlenmesi
- B) Anne sütü ile besleme
- C) Minimal enteral besleme
- D) Prematüre hazır maması ile besleme
- E) Probiyotik verilmesi

62. Aşağıdaki göz bulgularından hangisinin Down sendromlu çocuklarda görülmesi beklenmez?

- A) Strabismus B) Katarakt
C) Nistagmus D) Glokom
E) Bitot lekeleri

63. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda patolojik hiperbilirubinemi gelişmesi için risk faktörü değildir?

- A) Hazır mama ile besleme
B) Gebelik yaşının 35-36 hafta olması
C) Fototerapi almış kardeş öyküsü olması
D) Sefal hematoma
E) Erkek cinsiyet

64. Yenidoğanlarda sık görülen bir deri lezyonu olan Mongol lekesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Mavi pigmentli lezyonlardır.
B) Presakral bölge, kalça ve bel bölgesinde görülebilirler.
C) Down sendromlu bebeklerde daha sık görülür.
D) Bir yıl içinde kaybolurlar.
E) Malign değişim göstermezler.

65. Sadece mediastinal tutulumu olan non-Hodgkin lenfomalı bir çocuk hasta, Murphy sınıflamasına göre aşağıdaki evrelerden hangisine girer?

- A) Evre I B) Evre II C) Evre III
D) Evre IV E) Evre V

66. Üst mediastende kitlesi olan 2 yaşında erkek çocukta Horner sendromu saptanmıştır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lenfoma
B) Nöroblastom
C) Rabdomiyosarkom
D) Ewing sarkomu
E) Germ hücreli tümör

67. Otuz haftalık prematür ve hipoksik doğum öyküsü olan 6 aylık erkek bebek, uykuda iken ve uykudan uyanırken art arda sıçramaları olduğu için hastaneye getiriliyor.

Bu bebek için ön tanı ve tanıyı doğrulamak için en uygun tetkik aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Ön Tanı	Tetkik
A) İnfantil kolik	Karın ultrasonografisi
B) Gastroözofageal reflü	Reflü sintigrafisi
C) Erken miyoklonik epilepsi	Kraniyal ultrasonografi
D) İnfantil spazm	Uyku elektroensefalografisi
E) Absans nöbet	Elektroensefalografi

68. Ataksi-telanjektazi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Otozomal dominant geçişlidir.
- B) Uzun kemik kortekslerinde incelme vardır.
- C) Kardiyak rabdomyomlar görülür.
- D) Sinopulmoner enfeksiyonlar sık görülür.
- E) İriste, Lisch nodülleri görülür.

69. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda obstrüktif şok nedeni değildir?

- A) Perikardiyal tamponad
- B) Tansiyon pnömotoraks
- C) Masif akciğer embolisi
- D) Duktus bağımlı kalp hastalıklarında duktus arteriozusun birden kapanması
- E) Ventriküler taşikardi

70. Aşağıdaki doğumsal metabolik hastalıklardan hangisinde idrarda küf kokusu alınır?

- A) Fenilketonüri
- B) Glutarik asidemi
- C) İzovaleik asidemi
- D) Hawkinsinüri
- E) Homosistinüri

71. Daha önce hiçbir yakınması olmayan 18 aylık erkek bebek huzursuzluk, hâlsizlik, durdurulamayan ağlama ve kırmızı kanlı, mukuslu dışkılama nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede karın şişliği, letarjik ve soluk olduğu saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nekrotizan enterokolit
- B) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
- C) Gastrik duplikasyon
- D) İnvajinasyon
- E) Gastroenterit

72. Konjenital adrenal hiperplazinin aşağıdaki tiplerinden hangisinde hipertansiyon görülür?

- A) 21-hidroksilaz eksikliği
- B) 3β-hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği
- C) 17α-hidroksilaz eksikliği
- D) Lipoid konjenital adrenal hiperplazi
- E) P450 oksidoredüktaz eksikliği

73. Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri etiolojisinde rol oynamaz?

- A) Sigara kullanımı
- B) Alkol kullanımı
- C) A vitamini eksikliği
- D) Barrett özofagusu
- E) Helicobacter pylori'ye bağlı gastrit

74. Refeeding sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Metabolizmanın karbonhidrat yerine yağ kullanması sonucu ortaya çıkar.
- B) Verilen kalori miktarının yavaş artırılması ile önlenir.
- C) Total parenteral nütrisyon ve enteral nütrisyonunda izlenir.
- D) Ciddi malnütrisyon ve kilo kaybı olanlarda görülür.
- E) Hastalarda hipofosfatemi, hipomagnezemi ve hipokalemi görülür.

75. Primer peritonit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Çoğunlukla birden çok mikroorganizma sorumludur.
- B) Tedavisi için genellikle cerrahi gerekir.
- C) Mikroorganizma peritona, uzak bir odaktan hematojen yolla veya direkt inokülasyon ile ulaşabilir.
- D) Parasetezde beyaz küre sayısı 1000/mm³ üzerinde olmalıdır.
- E) Parasetezde safra veya intestinal içerik görülmesi ile tanı konabilir.

76. Ciddi sepsis ve septik şok tedavisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

- A) Kan şekerinin insülin infüzyonu ile 150 mg/dL civarında tutulması
- B) Ortalama arter basıncı 65 mmHg ve altında ise yoğun sıvı tedavisine başlanması
- C) Yeterli sıvı tedavisi ile ortalama arter basıncı yükselmez ise vazopresör tedaviye geçilmesi
- D) Sıvı tedavisinde santral venöz basıncın 8 mmHg'nin altında tutulması
- E) Vazopresör tedaviye rağmen sonuç alınmaz ise steroid kullanılması

77. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği yara iyileşmesini **inhibe etmez**?

- A) A vitamini
B) B vitamini
C) C vitamini
D) Çinko
E) Demir

78. Tüberküloz enterit, bağırsakta **en sık** aşağıdaki lokalizasyonların hangisinde görülür?

- A) Duodenum
B) Proksimal-orta jejunum
C) Sigmoid kolon ve rektum
D) Transvers kolon
E) Distal ileum ve çekum

79. Cerrahi tedavi uygulanan bir hastada ameliyat sonrası birinci günde Na^+ düzeyinin 108 mEq/L'ye düştüğü gözleniyor. İdrar Na^+ konsantrasyonu 68 mEq/L ve idrar ozmolaritesi 501 mOsm/L olarak bulunuyor.

Bu tablo aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

- A) Ameliyat sonrası aşırı intravenöz izotonik NaCl solüsyonu verilmesi
B) Ameliyat sırasında intravenöz kolloid solüsyon kullanılması
C) Ekstraselüler hacmin korunması için antidiüretik hormon salınımının artması
D) Perioperatif dönemde uygunsuz kan transfüzyonu yapılması
E) Ameliyat sonrası enteral yolla hiperozmolar sıvı verilmesi

80. Yetmiş iki yaşında erkek hasta karın ağrısı nedeniyle acil servise başvuruyor. Akut mezenterik oklüzyon tanısı konulan hastada arteriyel kan gazı analizinde metabolik asidemi tespit ediliyor.

Bu hastada hücresel düzeydeki metabolik durumu yansıtan en spesifik parametre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Serum laktat düzeyi
B) Arteriyel pH <7,35
C) Beyaz küre sayısı >20.000/mm³
D) Arteriyel kan CO₂ düzeyi
E) Arteriyel kan O₂ düzeyi

81. Ağır sepsis tablosunda olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi doku perfüzyon bozukluğunu **göstermez**?

- A) Sistolik kan basıncının <90 mmHg olması
B) Laktik asidemi
C) Oligüri
D) Taşikardi
E) Akut mental durum değişiklikleri

82. Yirmi bir yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası sonrası acil servise getiriliyor. Hızlı ultrasonografik değerlendirme ve bilgisayarlı tomografide II. derece dalak yaralanması tespit ediliyor.

Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin varlığı durumunda ameliyatsız izleme karar verilemez?

- A) Hemodinamik stabilite
- B) Tomografide arteriyel fazda kontrast maddenin ekstravaze olmaması
- C) Bilincin açık olması
- D) Kan transfüzyon gereksiniminin 2 üniteden az olması
- E) Peritonit

83. **Aşağıdakilerden hangisi temiz-kontamine yaraya örnektir?**

- A) Kolesistektomi
- B) Tiroidektomi
- C) İnguinal fitik onarımı
- D) Mastektomi
- E) Perfore apandisit varlığında apendektomi

84. **Organ nakli konusunda aşağıdaki etik unsurlardan hangisi ile en sık karşılaşılır?**

- A) Özerklik
- B) Zarar vermeme
- C) Adalet
- D) Sır saklama
- E) Doğruyu söyleme

85. **Meme başı ve areolada eritem ve ekzamatöz lezyon ile kendini gösteren meme hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Radial skar
- B) Paget hastalığı
- C) Anjiyosarkom
- D) Filloid tümör
- E) Duktal karsinoma in situ

86. **Meme kanserini erken evrede yakalamak için semptomu olmayan kadın nüfusunun toplum tabanlı taranmasına yönelik en etkin yöntem aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Kendi kendini meme muayenesi
- B) Meme muayenesi
- C) Meme ultrasonografisi
- D) Mamografi
- E) Manyetik rezonans görüntüleme

87. **Aşağıdakilerden hangisi ventilasyon / perfüzyon bozukluğuna bağlı olarak hipoksemi yapar?**

- A) Guillain-Barré sendromu
- B) Akut solunum zorluğu sendromu (ARDS)
- C) Hipofosfatemisi
- D) Opiatlar
- E) Pickwick sendromu

88. Aşağıdaki tiroid malignitelerinden hangisi iyot eksikliği ile ilişkilidir?

- A) Papiller tiroid kanseri B) Anaplastik tiroid kanseri
C) Foliküler tiroid kanseri D) Tiroid lenfoması
E) Medüller tiroid kanseri

89. Toksik multinodüler guatr ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yaşlı insanlarda daha sık görülür.
B) Çoğu hastanın öyküsünde non-toksik multinodüler guatr vardır.
C) Bulgular genellikle yavaş ortaya çıkar.
D) Bazı hastalarda tanı, atrial fibrilasyon ve konjestif kalp yetmezliği araştırılırken konulur.
E) Göz bulguları, pretibial miksödem gibi tiroid dışı bulgular sıklıkla saptanır.

90. Hafif derecede akut pankreatitte aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi zorunlu değildir?

- A) Fizyolojik monitörizasyon
B) Antibiyotik tedavisi
C) Ağrı tedavisi
D) Sıvı elektrolit dengesinin sağlanması
E) Metabolik desteğin sağlanması

91. Anal fissür ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Hastaların %90'ında fissür ön orta hattadır.
B) Kronik fissürde, lezyonun tabanında eksternal sfinkter lifleri görülür.
C) Anal kanal istirahat basıncının yüksekliği ve bölgedeki kan dolaşımının yetersizliğinden kaynaklanır.
D) Arka orta hat yerleşimi anal tüberkülozu düşündürmelidir.
E) Kabızlığın bir sonucu olarak gelişir.

92. Aşağıdakilerden hangisi primer hiperparatiroidizmde mutlak cerrahi tedavi endikasyonu değildir?

- A) Hastanın genç olması
B) Kemik mineral dansitesinin iki alanda 2 standart sapmadan daha fazla azalması
C) Serum kalsiyum konsantrasyonunun, üst limitin 1 mg/dL üzerinde olması
D) Hastanın tıbbi izleminin mümkün olmaması
E) Primer hiperparatiroidizme bağlı ciddi komplikasyonların gelişmiş olması

93. Barret özofagusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Özofagustaki çok katlı yassı hücrelerin intestinal kolumnar hücre ile yer değiştirmesi olarak tanımlanır.
- B) Kronik gastroözofageal reflü en önemli nedeni olarak görülmektedir.
- C) Metaplazik kolumnar hücreler, reflünün oluşturduğu hasara ve malignite gelişimine daha dirençlidir.
- D) Gastroözofageal reflü hastalarının %10'unda gelişir.
- E) Gelişiminde mide asit içeriği ve safra etkilidir.

94. Aşağıdakilerden hangisi kolonun divertiküler hastalığının komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Apse
- B) Fistül
- C) Yaygın peritonit
- D) Obstrüksiyon
- E) Malignite

95. Parotiste, yetişkin çağda en sık rastlanan malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Skuamöz hücreli karsinom
- B) Mukoepidermoid karsinom
- C) Adenokarsinom
- D) Adenoid kistik karsinom
- E) Asiner hücreli karsinom

96. Endotrakeal entübasyonda tüpün trakea içine yerleştirilmiş olduğunu aşağıdakilerden hangisi en iyi gösterir?

- A) Solunum seslerinin oskültasyonu
- B) End-tidal karbondioksit basıncı ölçümü
- C) Oksijen satürasyonu
- D) Nabız ve arteriyel basınç izlemi
- E) Hastanın dudak renginin izlemi

97. Beyinde anevrizmaların en sık kaynaklandığı arter aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Orta serebral arter
- B) Posterior komunikan arter
- C) Baziler arter
- D) Anterior komunikan arter
- E) Vertebral arter

98.

- I. Eklem yeterli miktarda boşaltılmalıdır.
- II. Antibiyotik tedavisi verilmelidir.
- III. Eklem stabil pozisyonda istirahat ettirilmelidir.
- IV. Ponksiyon ile elde edilen eklem sıvısının kültür sonucu gelinceye kadar hastaya müdahale edilmemelidir.

Akut septik artrit tedavisiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) II ve III
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

99. En sık görülen renal füzyon anomalisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) At nalı böbrek B) Disk böbrek
C) Sigmoid böbrek D) Torasik böbrek
E) Pelvik böbrek

100. Aşağıdaki bulgulardan hangisi perikart tamponadında görülmez?

- A) Santral venöz basıncın artması
B) Kalp seslerinin derinden gelmesi
C) Taşikardi
D) Hipotansiyon
E) EKG'de amplitüdün artması

101. Asit-alkali içimi sonrası gelişen özofagus yaralanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Nötralizasyon ek hasar oluşturacağından tercih edilen bir tedavi değildir.
B) Tanıda, 12-24 saat sonra yapılacak üst endoskopi çok değerlidir.
C) Radyopak madde ile özofagografi erken dönemde yapılmalıdır.
D) Hastanın kusması sağlanmalıdır.
E) Asit sıvılar, alkali olanlara oranla özofagusa daha fazla zarar verir.

102. Kardiyopulmoner by-pass sonrası bir süredir yoğun bakımda yatan kritik durumdaki bir hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisinin görülme sıklığı artmaz?

- A) Mezenterik iskemi
B) Paralitik ileus
C) Akut akalkülöz kolesistit
D) Akut apandisit
E) Akut pankreatit

103. Retroperitoneal apsenin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Böbrek hastalıkları
B) Gastrointestinal hastalıklar
C) Karın dışı enfeksiyonlar
D) Kemik enfeksiyonları
E) Travma

104. Protez, greft gibi implantların uygulandığı ameliyatlarda cerrahi alan enfeksiyonu tanısı koyabilmek için enfeksiyon en geç ne zaman ortaya çıkmalıdır?

- A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay
D) 1 yıl E) 2 yıl

105.

- I. Midenin rezervuar fonksiyonunun ortadan kaldırılması
- II. Pilor sfinkter mekanizmasının ortadan kaldırılması
- III. Vagal sinirlerin kesilmesi

Postgastrektomi sendromuna neden olan cerrahi girişimler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

106. Koledokolitiazis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Primer safra yolu taşları tanımı safra kesesinden safra yoluna geçen taşlar için kullanılır.
- B) Primer safra yolu taşları genellikle kahverengi pigment taşlardır.
- C) Birçok safra yolu taşı klinik olarak sessizdir ve kolanjiyografi sırasında tanınır.
- D) Kolesistektomi sonrası %1-2 hastada safra yollarında taş nedeniyle sorun yaşanır.
- E) Safra yolu taşları; sarılık, sağ üst kadrın ağrısı ve ateşle seyreden kolanjit tablosuna neden olabilir.

107. Aşağıdakilerden hangisi kalp dışı cerrahi girişim geçirecek bir hastada kardiyak sorun gelişimi için bir risk faktörü değildir?

- A) Diabetes mellitus
- B) Böbrek yetmezliği
- C) İskemik kalp hastalığı
- D) Genel durum bozukluğu
- E) Aspleni

108. İnvajinasyon, rektal prolapsus, kolon striktürü, safra yolları tıkanıklığı ve apandisit gibi birçok cerrahi sorunun görülebildiği hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hirschsprung hastalığı
- B) Küçük sol kolon sendromu
- C) İnterstinal psödoobstrüksiyon
- D) Nekrotizan enterokolit
- E) Kistik fibrozis

109. Antepartum fetal iyilik hâlini değerlendirme amacı ile yapılan modifiye biyofizik profil skorlamasındaki parametreler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Fetal tonus, fetal hareket, fetal solunum, non stres test
- B) Fetal solunum, amniyotik sıvı miktarı
- C) Fetal tonus, amniyotik sıvı miktarı
- D) Non stres test, amniyotik sıvı miktarı
- E) Fetal tonus, non stres test, amniyotik sıvı miktarı

110. Kanama şikâyetiyle gelen ve çocuk doğurmak isteyen bir kadının tanısız amaçla yapılan küretaj materyalinde patoloji atipik kompleks hiperplazi bulunmuştur. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aromataz inhibitör verilmesi
- B) Trakelektomi yapılması
- C) Oral progesteron tedavisi
- D) Bakırlı rahim içi araç yerleştirilmesi
- E) Metotreksat verilmesi

111. Otuz altı yaşında gravidası 3, paritesi 2 olan ve 37 hafta 3 günlük gebe hastaneye başvuruyor. Öyküsünden 2 kez sezaryen geçirdiği öğrenilen hastanın 2 dakikada bir 40-45 saniye süren ağrılı kontraksiyonları saptanıyor. Hastaneye geldiğinde 2 cm açıklık ve %40 silinmesi olan hastanın, başvurusundan 3 saat sonra yapılan muayenesinde servikal açıklık 5 cm ve silinme %60 olarak tespit ediliyor. Bu sırada maternal ve fetal taşikardi ile birlikte annede kan basıncı 80/40 mmHg olarak ölçülüyor ve uterus kontraksiyonları kayboluyor.

Bu hasta için en olası tanı ve yaklaşım aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Tanı	Yaklaşım
A) Uterin rüptür	Tokoliz ile eylemin durdurulması ve maternal intravenöz hidrasyon
B) Uterin rüptür	Acil sezaryen ve rüptürün tamiri
C) Uterin atoni	Acil sezaryen
D) Uterin arter rüptürü	Acil laparotomi
E) Uterin rüptür	Acil sezaryen ve hipogastrik arter ligasyonu

112. Preterm eylem taramasında kullanılan ve serviko-vajinal sıvıda bulunan glikoprotein yapısındaki madde aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fetal alfa fetoprotein
- B) Fetal östriol
- C) Fetal fibronektin
- D) Fetal kortizol
- E) İnsan koryonik gonadotropin

113. Aşağıdakilerden hangisi epitelyal over kanseri etiyolojisinde risk faktörleri arasında değildir?

- A) Erken menopoz
B) Erken menarş
C) Lynch I sendromu
D) Düşük parite
E) İnfertilite

114. Parsiyel bir molde aşağıdaki karyotiplerden hangisi en sık saptanır?

- A) 46, XX
B) 46, XY
C) 46, YY
D) 69, XXX
E) 69, XYY

115. Günlük 15 mikrogram dozla östrojen içeriğinin en düşük olduğu kontraseptif yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trifazik oral kontraseptif haplar
B) Vajinal halka
C) Monofazik oral kontraseptif haplar
D) Transdermal kontraseptif yapıştırıcılar
E) Kombine östrojen-progestin enjeksiyonu

116. Aşağıdakilerden hangisi over granüloza-lütein hücrelerdeki steroidogenezis için önemli bir kolesterol kaynağıdır?

- A) LDL
B) HDL
C) cAMP
D) Östradiol
E) Androstenedion

117. Progesterinlerin endometriozis tedavisindeki başarısı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

- A) Endometriotik doku büyümesinin inhibisyonu
B) Gonadotropik inhibisyon
C) Overde östrojen yapımının supresyonu
D) İmplantlarda desidüalizasyon
E) Androjenik etki

118. Aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyindeki yüksekliği tanıyı polikistik over sendromundan uzaklaştırır?

- A) Androstenedion
B) Lüteinleştirici hormon
C) 17-hidroksi progesteron
D) Dehidroepiandrosteron
E) İnsülin

119. Yeni nesil kombine oral kontraseptif kullananlarda aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığında azalma beklenmez?

- A) Semptomatik pelvik inflamatuvar hastalık
- B) Demir eksikliği anemisi
- C) Akne
- D) Vajinit
- E) Benign meme kisti

120. Ektopik gebelik riski ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Önceden ektopik gebelik geçirenlerde risk artar.
- B) Seksüel yolla bulaşan hastalıklarda risk artar.
- C) Sigara içenlerde risk artar.
- D) Elektrokoter yöntemi ile yapılan tübal sterilizasyonda risk artar.
- E) Gebe olmayan kontrol gruplarına göre, oral kontraseptif kullanımında risk artar.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

- Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açılöçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Sınava kalem, silgi, kalemıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.**
- Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi **150 dakikadır.** Sınav başladıktan sonra **ilk 110** ve **son 15** dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. **Bu süreler dışında, cevaplamaı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.**
- Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.**
- Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
- Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
- Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyararak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
- Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
- Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaları eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınınzdaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.
- Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
- Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
- Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
- Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
- Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2012 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

SONBAHAR DÖNEMİ

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

- | | | | |
|-------|-------|-------|------------|
| 1. D | 31. B | 61. D | 91. C |
| 2. A | 32. C | 62. E | 92. İPTAL |
| 3. E | 33. A | 63. A | 93. C |
| 4. A | 34. D | 64. C | 94. E |
| 5. B | 35. B | 65. C | 95. B |
| 6. B | 36. E | 66. B | 96. B |
| 7. D | 37. A | 67. D | 97. D |
| 8. E | 38. D | 68. D | 98. C |
| 9. C | 39. C | 69. E | 99. A |
| 10. C | 40. A | 70. A | 100. E |
| 11. D | 41. B | 71. D | 101. B |
| 12. E | 42. D | 72. C | 102. D |
| 13. B | 43. E | 73. E | 103. A |
| 14. A | 44. B | 74. A | 104. D |
| 15. C | 45. A | 75. C | 105. E |
| 16. D | 46. E | 76. D | 106. A |
| 17. E | 47. C | 77. B | 107. E |
| 18. C | 48. B | 78. E | 108. E |
| 19. A | 49. A | 79. C | 109. D |
| 20. B | 50. D | 80. A | 110. C |
| 21. B | 51. E | 81. D | 111. B |
| 22. E | 52. C | 82. E | 112. C |
| 23. A | 53. A | 83. A | 113. İPTAL |
| 24. D | 54. C | 84. C | 114. D |
| 25. C | 55. B | 85. B | 115. B |
| 26. E | 56. D | 86. D | 116. A |
| 27. A | 57. E | 87. B | 117. E |
| 28. C | 58. C | 88. C | 118. C |
| 29. D | 59. A | 89. E | 119. D |
| 30. B | 60. B | 90. B | 120. E |