

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI
(İLKBAHAR DÖNEMİ)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
23 MAYIS 2010

ADI :
SOYADI :
T.C. KİMLİK NUMARASI :
SALON NUMARASI :

GENEL AÇIKLAMA

1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve salon numaranızı yazmayı unutmayınız.
2. Bu soru kitapçığındaki test, toplam 100 sorudan oluşmaktadır ve soruların cevaplanması için verilen süre **150 dakikadır (2,5 saat)**.
3. Bu kitapçıkta soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun-kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konmayacaktır.
4. Bu kitapçıkta her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. **Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.** Bu nedenle bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2010 - YDUS İlkbahar / Çoc. Sağ. ve Hast.

1. HIV enfeksiyonu olduğu bilinen bir annede aşağıdakilerden hangisi bebeğe geçişi azaltmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

- A) Anneye antiretroviral tedavi verilmesi
- B) Bebeğe doğumda tedavi başlanması
- C) Doğumun spontan vajinal yolla yapılmasının sağlanması
- D) Annenin viral yükünün doğum öncesi mümkün olan en düşük düzeye indirilmesi
- E) Bebeğe anne sütü verilmemesi

2. Doğum salonunda solunum yetersizliği nedeniyle re-susitasyon yapılan bir yenidoğana son 30 saniyede maske ve hava kesesi ile pozitif basınçlı ventilasyon uygulanmıştır. Bu girişim sonrası değerlendirilmede, bebeğin kalp hızı 50/dakika olarak bulunmuştur.

Bu bebek için bundan sonraki aşamada en uygun yaklaşım aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

- A) Göğüs kompresyonu ve solunum desteği
- B) Adrenalin ve göğüs kompresyonu
- C) Adrenalin ve solunum desteği
- D) Göğüs kompresyonu ve ek oksijen
- E) Solunum desteği ve taktil uyaran

3. Vücut ağırlığı 3200 gram olan zamanında doğmuş bir yenidoğan için endotrakeal tüp çapı ve üst dudak seviyesinden yerleştirme derinliği aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

	<u>Endotrakeal tüp çapı (mm)</u>	<u>Yerleştirme derinliği (cm)</u>
A)	3	7.2
B)	3	8.2
C)	3	9.2
D)	4	7.2
E)	4	9.2

4. Aşağıdakilerden hangisi kernikterusun ilk fazında gözlenen bir bulgudur?

- A) Aktif derin tendon refleksleri
- B) Retrokollis
- C) Ateş
- D) Stupor
- E) Gözlerde yukarı bakış

Diğer sayfaya geçiniz.

5. Zamanında doğmuş bir yenidoğanda 20. saatte sarılık gözleniyor. Laboratuvar tetkiklerinde total bilirübin düzeyi 11 mg/dL olarak bulunuyor.

Bu bebekteki sarılığın nedeni en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipoksi
- B) Crigler-Najjar sendromu
- C) Biliyer atrezi
- D) Sürenal hematomu
- E) Galaktozemi

6. Anemik bir yenidoğanda retikülosit sayısının ve ortalama eritrosit hacminin normal sınırlarda olduğu gözleniyor ve Coombs testi negatif olarak bulunuyor.

Bu çocuktaki aneminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Konjenital hipoplastik anemi
- B) α -talasemi
- C) Kell grup uygunsuzluğu
- D) Kronik intrauterin kan kaybı
- E) Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği

7. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın pulmoner hemorajisi için önerilen ventilatör stratejilerinden biridir?

- A) Yüksek pozitif ekspirasyon sonu basıncı
- B) Yüksek tepe inspiratuvar basıncı
- C) Uzun ekspirasyon zamanı
- D) Yüksek hız
- E) Yüksek inspirasyon/ekspirasyon oranı

8. Sağlıklı görünen 5 günlük bir erkek bebekte trombosit sayısı $20\ 000/\text{mm}^3$ olarak bulunuyor. Random trombosit transfüzyonu ile trombosit sayısı $110\ 000/\text{mm}^3$ e kadar yükseliyor. 20 saat sonra yapılan kan sayımında ise trombosit sayısı $112\ 000/\text{mm}^3$ olarak saptanıyor.

Bu bebekteki trombositopeninin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Neonatal alloimmün trombositopeni
- B) Maternal immün trombositopeni
- C) Wiskott-Aldrich sendromu
- D) Amegakaryositik trombositopeni
- E) Maternal preeklampsi

Diğer sayfaya geçiniz.

9. Zamanında doğmuş bir yenidoğanda menenjit şüphesiyle lomber ponksiyon yapılıyor.

Aşağıdaki beyin omurilik sıvısı (BOS) bulgularından hangisi menenjit tanısını destekler?

- A) BOS ta görülen hücrelerin yaklaşık % 50 sinin polimorfonükleerler olması
- B) BOS protein düzeyinin 150 mg/dL olması
- C) BOS/kan şekeri oranının % 100 olması
- D) BOS glukoz düzeyinin 35 mg/dL olması
- E) 1 mm^3 te 50 lökosit bulunması

10. Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonunda kullanılan aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisinin kanıtlanmış kalıcı yan etkisi sensorinöral işitme kaybıdır?

- A) Hiperventilasyon
- B) Pankuronyum
- C) İn hale nitrik oksit
- D) Sildenafil
- E) Prostaglandin I₂

11. Zamanında normal doğum ağırlığı ile doğan bir bebekte 2 haftalık olduğunda kalp yetmezliği geliyor. Ekokardiyografide ventriküllerde dilatasyon, duvar incilmesi ve sistolik disfonksiyon saptanıyor.

Aşağıdaki durumlardan hangisi bu bebekteki belirti ve bulgulara neden olmaz?

- A) Annede diabetes mellitus varlığı
- B) Persistan supraventriküler taşikardi
- C) Adenovirus enfeksiyonu
- D) Miyokart enfarktüsü
- E) Kritik aort darlığı

12. Progresif hidrosefali nedeniyle yaşamının 3. haftasında ventriküloperitoneal şant yerleştirilen 28 haftalık prematüre bir bebekte 4 haftalıkken sepsis tablosu gözleniyor.

Bu bebeğin tedavisi için en uygun antibiyotik kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ampisilin + Gentamisin
- B) Ampisilin + Sefotaksim
- C) Vankomisin + Sefotaksim
- D) Seftazidim + Gentamisin
- E) Klaritromisin + Vankomisin

13. Aşağıdaki durumların hangisinde genetik danışma gerekmez?

- A) Anne yaşının ≥ 35 olması
- B) Baba yaşının ≥ 50 olması
- C) Önceki çocukta metabolik hastalık varlığı
- D) Annenin sigara içicisi olması
- E) Tekrarlayan düşük öyküsü

14. Aşağıdaki kromozom anomalilerinden hangisi Klinefelter sendromuna uymaz?

- A) 47,XXY B) 47,XXX C) 48,XXXY
D) 48,XXYY E) 49,XXXYY

15. Mental retardasyon etiyojisi incelenen 15 yaşında bir erkek çocuğun muayenesinde, yüzünün uzun, kulaklarının büyük ve belirgin olduğu, stereotipik hareketlerinin ve konuşmalarının bulunduğu, göz kontağı kurmadığı ve elini ısırıldığı dikkati çekiyor. Genital muayenede ise makroorşidi saptanıyor. Öz geçmişinden dayısında da daha hafif olmak üzere mental retardasyon olduğu, fiziksel bulguların çocuğa benzediği öğreniliyor. Ayrıca dayıda daha önce yapılan bir incelemede FMR1 geninde üçlü tekrar dizisi sayısının 200 ün üzerinde olduğunu belirten bir rapor gösteriliyor. Muayene sonucunda aile bir çocuğa daha sahip olmak istediğini belirtiyor.

Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Çocuk kız olursa bu hastalık görülmez.
B) Çocuk erkek olursa bu hastalık % 100 görülür.
C) Cinsiyet fark etmez, bu hastalık % 25 görülür.
D) Çocuk kız olursa bu hastalık % 100 görülür.
E) Çocuk erkek olursa bu hastalık % 50 görülür.

16. Difteri-aselüler boğmaca-tetanoz (DaBT) aşısının ilk dozu en erken ne zaman uygulanabilir?

- A) 2. hafta B) 4. hafta
C) 6. Hafta D) 8. hafta
E) Doğumdan itibaren her zaman

17. Çok sayıda aşının aynı anda uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Üç aşından fazlasının eş zamanlı olarak uygulanması bebeğin immünolojik kapasitesini aşır, aşının etkisiz kalmasına yol açabilir.
B) Kızamık-kızamıkçık-kabakulak ve suçiçeği aşıları eş zamanlı olarak uygulanabilir.
C) Farklı aşılar aynı enjektör içine çekilerek yapılabilir.
D) Aşılar gerektiğinde aynı ekstremiteye yapılabilir, ancak aralarında 1 cm uzaklık olmalıdır.
E) Eş zamanlı uygulanmıyorsa DaBT ve BCG aşıları arasında en az 4 hafta olmalıdır.

18. Aşağıdaki bulgulardan hangisi sarsılmış bebek sendromu için tipik değildir?

- A) Bebeğin göz dibinde bilateral kanama olması
B) Kranial tomografide subdural kanama görülmesi
C) Bebeğin alnında ekimoz olması
D) Bebeğin kostalarında kırık olması
E) Bebeğin konvülsiyon geçirmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi 6 aylık bir bebeğin gelişimsel olarak yapamayacağı bir beceridir?

- A) Çıngırağını sallaması
- B) Cisimlere uzanması
- C) Tek heceli sesler çıkarması
- D) Cisimleri 180° izlemesi
- E) İki küpü birbirine vurması

20. Üç yaşında bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

- A) Bir üçgeni kopya edebilmesi
- B) Basamakları alternatif ayakla çıkabilmesi
- C) 3 tekerlekli bisiklete binebilmesi
- D) Ellerini yıkamayı becerebilmesi
- E) Kısa süreli de olsa tek ayak üzerinde durabilmesi

21. Münchausen by proxy sendromu (bakım verenin yapay bozukluğu) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Çocukta gerçekte olmayan bir hastalığın yaratılması durumudur.
- B) Hastalığın nedeni genellikle annelerin çocuklarına duyduğu nefrettir.
- C) Bakım verenin kendisinde de açıklanamayan hastalık öyküleri vardır.
- D) Apne ve konvülsiyon en sık rastlanan başvuru nedenlerindedir.
- E) Çocuklar büyüdükçe kendilerinde bir hastalık olduğuna ikna olabilirler.

22. Çocukların cinsel istismarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Cinsel istismar bildirimlerinin son yıllarda giderek artması cinsel istismar olaylarının artmasının sonucudur.
- B) Tacizciler sıklıkla çocukların tanımadığı kişilerdir.
- C) Özürlü olan çocuklar cinsel tacize daha az uğrarlar.
- D) Tacizciler sıklıkla çocuğa şiddet de uygularlar.
- E) Tacize uğrayan çocuklar sıklıkla özgüveni düşük olanlardır.

23. Kritik hasta çocuğun beslenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Sağlıklı olduğu döneme göre protein gereksinimi artmış, enerji gereksinimi aynı kalmıştır.
- B) Günlük enerjinin yarısı karbonhidratlar diğer yarısı lipidler ile sağlanmalıdır.
- C) Yeterli enerji sağlanmasına karşın hipoglisemi gelişimi sıklıkla izlenir.
- D) Kontrendikasyon yoksa az da olsa enteral beslenmeye devam edilmelidir.
- E) İntravenöz sıvı desteğinden parenteral beslenmeye geçiş genellikle 1 hafta-10 gün sonra olmalıdır.

24. Aşağıdakilerin hangisinde bir madde, antidotu ile birlikte verilmemiştir?

Madde	Antidot
A) Metanol	Etanol
B) Organofosfat	Atropin
C) Asetaminofen	Asetilsistein
D) Narkotik	Nalokson
E) Heparin	Vitamin K

25. Demir zehirlenmesinin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

- A) Aktif kömür verilmesi
- B) Tüm bağırsak irrigasyonu yapılması
- C) İntravenöz deferoksamin yapılması
- D) İntramusküler deferoksamin yapılması
- E) Cerrahi ya da endoskopik yöntemlerle ilacın uzaklaştırılması

26. Aşağıdakilerden hangisi digoksin zehirlenmesinin izlenmesinde önemli bir belirteçtir?

- A) Sodyum
- B) Potasyum
- C) Kalsiyum
- D) Magnezyum
- E) Fosfor

27. Canlandırma (kardiyopulmoner resusitasyon) sırasında kullanılan atropin dozu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Damar içi ve kemik içi dozu 0.02 mg/kg dir.
- B) Minimum dozu 0.1 mg dir.
- C) Endotrakeal dozu 0.03 mg/kg dir.
- D) Süt çocuğunda minimum tek doz 0.5 mg dir.
- E) Adolesanda minimum tek doz 2.5 mg dir.

28. Altı aylık bir bebek ventriküler septal defekt ameliyatı sonrasında mekanik ventilatörde izlenirken genel durumunda kötüleşme nedeniyle değerlendiriliyor ve kalp hızı: 210/dakika, ritmik, sinüzal, periferik nabızları alınamıyor, kan basıncı 52/24 mmHg olarak bulunuyor.

Bu bebeğin tedavisinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisine başlanmalıdır?

- A) Milrinon
- B) Adrenalin
- C) Dobutamin
- D) Dopamin
- E) Noradrenalin

29. Bir mikroorganizmaya bağlı sistemik inflamatuvar yanıt sendromu gelişmiş bir hastada, bir veya birden fazla organ yetmezliği varsa aşağıdakilerden hangisi düşünülmalıdır?

- A) Sepsis
- B) Septik şok
- C) Ağır sepsis
- D) Refrakter septik şok
- E) Distribütif şok

30. Penetre karın travmalarında yaralanma olasılığı en az olan organ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pankreas
- B) Böbrekler
- C) Bağırsaklar
- D) Dalak
- E) Karaciğer

31. Organ yetmezliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kardiyovasküler yetmezlik: 1 saat içinde ≥ 40 ml/kg izotonik intravenöz sıvı verilmesine karşın kan basıncı yaş için normal değer 5. persentilinden az ise
- B) Respiratuvar yetmezlik: non elektif invaziv ya da noninvaziv mekanik ventilasyona gereksinim varsa
- C) Hematolojik yetmezlik: INR (international normalized ratio) > 1 ise
- D) Renal yetmezlik: serum kreatinin düzeyi o yaş için normal üst değer 2 katından fazlaysa
- E) Hepatik yetmezlik: yenidoğan dışında total bilirubin düzeyi ≥ 4 mg/dL ve ALT düzeyi o yaş için normal üst değer 2 katından fazlaysa

32. Klinik evrelemeye göre, evre 4 ensefalopati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hasta komatözdür.
- B) Yalnızca ağrıya cevabı vardır.
- C) Pupil cevabı zayıftır.
- D) Solunumu çok düzensizdir.
- E) Dekortike postürdedir.

33. Aşağıdakilerden hangisi molibden kofaktör eksikliğinin özelliklerinden biri değildir?

- A) Sistein ve pürin metabolizması bozukluğu olması
- B) Yenidoğan döneminde başlayan kontrol edilemeyen nöbetler ve ağır gelişme geriliği yaratması
- C) İdrarda ürik asit atılımında artma gözlenmesi
- D) Otozomal resesif kalıtılması
- E) Bilateral oküler lens dislokasyonunun yenidoğan döneminden sonra yaşayabilen hastalarda gelişmesi

34. Aşağıdaki metabolizma hastalıklarından hangisinin deri bulgusu yoktur?

- A) Prolidaz eksikliği
- B) Tirozinemi tip II
- C) Biotinidaz eksikliği
- D) Kreatin eksikliği
- E) Hartnup hastalığı

35. Otuz altı haftalık doğan bir erkek bebekte, yaşamın 2.-3. gününde hiperamonemik koma geliyor. Plazma amonyak düzeyi 2000 $\mu\text{mol/L}$ (1175 $\mu\text{g/dL}$), yalnızca glutamin ve alanin düzeyleri yüksek; idrar orotik asit düzeyi normal olarak bulunuyor.

Asidozu bulunmayan bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yenidoğanın geçici hiperamonemisi
- B) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği
- C) N-asetilglutamat sentetaz eksikliği
- D) Ornitin transkarbamilaz eksikliği
- E) Arjininosüksinat sentetaz eksikliği

36. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde **sekonder hiperokzalüri beklenen bir bulgudur?**

- A) Hipotiroidi
- B) Juvenil romatoid artrit
- C) İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
- D) Akciğer tüberkülozu
- E) Rikets

37. Otozomal resesif kalıtılan, palmar ve plantar hiperkeratoz, herpetiform korneal ülserler ve mental retardasyonla karakterize Richner-Hanhart sendromu aşağıdaki amino asitlerden hangisinin metabolizmasındaki bozukluk sonucu ortaya çıkar?

- A) Fenilalanin B) Tirozin C) Metionin
D) Glisin E) Triptofan

38. Neonatal intrahepatik kolestaz durumunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmalıdır?

- A) Arjininosüksinik asidüri B) Tirozinemi tip II
C) Arjininaz eksikliği D) Sitrülinemi tip II
E) Gyrate atrofi

39. Aşağıdakilerden hangisi salmonella gastroenteriti sırasında bakteriyemi riskini artıran faktörlerden biri değildir?

- A) Demir eksikliği anemisi
B) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
C) Kollajen vasküler hastalık
D) Gastrektomi-gastroenterestomi
E) Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı

40. Çocukluk çağı mikoplazma pnömonisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sıklıkla nezle ile birlikte görülür.
B) Lober pnömoni nadiren görülür.
C) Hiler lenfadenopati görülebilir.
D) Lökosit sayısı ve periferik yayma genellikle normaldir.
E) Eritrosit sedimentasyon hızı genellikle artmıştır.

41. Aşağıdaki Bartonella türlerinden hangisi en sık kedi tırnağı hastalığına yol açar?

- A) B. bacilliformis B) B. quintana
C) B. henselae D) B. elizabethae
E) B. clarridgeiae

42. Aşağıdakilerin hangisinde bir enfeksiyon, inkübasyon süresi ile birlikte verilmemiştir?

Enfeksiyon	İnkübasyon süresi (gün)
A) Kızamıkçık	2 – 5
B) 5. Hastalık (Erythema infectiosum)	4 – 28
C) Kızamık	10 – 12
D) Kabakulak	14 – 24
E) Kuduz	20 – 180

43. Aşağıdaki varisella olgularının hangisinde oral asiklovir tedavisi endike değildir?

- A) 14 yaşında erkek çocuk
- B) 17 aylık kronik enfekte seboreik dermatiti olan bebek
- C) 15 aylık kistik fibrozisli bebek
- D) 2 yaşında aralıklı inhale steroid kullanan çocuk
- E) 7 yaşında okula giden çocuk

44. Aşağıdaki çocuk hastaların hangisinde sistemik inflamatuvar yanıt sendromu vardır?

- A) Rektal yoldan ölçülen vücut sıcaklığı 38 °C olan ve uykuda solunum sayısı yaşına göre > 2 standart sapma olan çocuk
- B) Herhangi bir dış uyaran, ağrı veya ilaç kullanımı olmaksızın kalp atım hızı yaşına göre > 2 standart sapma olan ve periferik yaymada % 15 çomak nötrofil saptanan çocuk
- C) Rektal yoldan ölçülen vücut sıcaklığı 36 °C olan ve 15 dakika süreyle bradikardik bulunan çocuk
- D) Rektal yoldan ölçülen vücut sıcaklığı 39 °C olan ve anestezi altındayken mekanik ventilasyon gereksinimi olan çocuk
- E) Vücut sıcaklığı, solunum sayısı veya lökosit sayısında normalden sapma olmadan ve ilaç kullanımı, ağrılı uyaran olmaksızın son 4 saatte kalp atım hızı yaşına göre > 2 standart sapma üzerine persistan yükselen çocuk

45. Akut lenfoblastik lösemili bir hastanın kemoterapisi sürerken ateşi yükseliyor. Hastanın tam kan sayımında lökosit sayısı $500/\text{mm}^3$, toplam nötrofil sayısı $100/\text{mm}^3$ olarak bulunuyor.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin bulunması durumunda başlangıç antibiyotik tedavisine vankomisin eklemek gerekli değildir?

- A) Şiddetli mukozit
- B) Hipotansiyon
- C) Kateter enfeksiyonu düşünülmesi
- D) Hastada metisiline dirençli Staphylococcus aureus ile kolonizasyon
- E) Enterit

46. PFAPA (periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit) sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Genellikle 7 yaşından sonra görülür.
- B) Genellikle 4-8 yılda spontan olarak düzelir.
- C) Bazı hastalarda artralji görülebilir.
- D) Tek doz prednizolona cevap verebilir.
- E) Etiyolojisi ve patogenezisi tam olarak bilinmemektedir.

48. Aşağıdakilerden hangisi komplike ampiyemde plevra sıvısının özelliklerinden biri değildir?

- A) Hücre sayısı $> 5000/\text{mm}^3$
- B) Plevra sıvısı/serum LDH oranı > 0.6
- C) Plevra sıvısı/serum protein oranı > 0.5
- D) pH > 7.20
- E) Glukoz düzeyi $< 40 \text{ mg/dL}$

47. Toksik görünümlü ve fokal odaksız yüksek ateşi olan bir bebeğin tanı ve tedavisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kan, idrar ve BOS örnekleri alındıktan sonra hemen antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır.
- B) Lomber ponksiyondan sonra ortaya çıkan menenjit genellikle lomber ponksiyon sırasında inokülasyonu düşündürür.
- C) Hastanın hastanede yatarak tedavi edilmesi gerekir.
- D) Antimikrobiyal tedavi planı ampiriktir.
- E) Hastada *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *N. meningitidis* bakteriyemisi olabilir.

49. Aşağıdakilerden hangisi bronşiektazi nedeni değildir?

- A) Kistik fibrozis
- B) Primer siliyer diskinezi
- C) Pulmoner hemosiderozis
- D) Boğmaca pnömonisi
- E) Akciğer tüberkülozu

50. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeni değildir?

- A) Orak hücreli anemi
- B) Hiperimmünoglobulin E sendromu
- C) Lökosit adezyon defekti
- D) Aort koarktasyonu
- E) Pulmoner sekestrasyon

52. Anafilaksinin acil tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi gereksizdir?

- A) H₂ antihistaminikler
- B) Adrenalin
- C) β-agonistler
- D) Kortikosteroidler
- E) Lökotrien antagonisti

51. Daha önce kistik fibrozis tanısı alan 8 aylık bir kız bebek beslenememe ve halsizlik yakınmalarıyla getiriliyor. Dehidrate görünümdeki bebeğin kan elektrolitlerinin değerlendirilmesinde sodyum: 120 mEq/L, potasyum: 2.8 mEq/L, klor: 80 mEq/L, HCO₃: 38 mEq/L, BUN: 40 mg/dL, ürik asit: 11 mg/dL bulunuyor.

Bu bebekte aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) Malabsorpsiyona bağlı tuz kaybı
- B) Terle elektrolit kaybına bağlı hipokloremik metabolik alkaloz
- C) Aşırı kusma ile tuz kaybı
- D) Akciğer enfeksiyonu sonucu hiperventilasyon ile sıvı kaybı
- E) İlaçlara bağlı elektrolit imbalansı

53. Herediter anjiyoödem tanısında aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi yardımcıdır?

- A) Atak sırasında CH₅₀ de azalma görülmesi
- B) C₃ ün yüksek olması
- C) C₄ ün normal olması
- D) C₁ inhibitörün her zaman normal olması
- E) Atak sırasında C₂ nin değişmemesi

54. Üç yaşından küçük ve tekrarlayan "wheezing" öyküsü veren aşağıdaki çocuk hastaların hangisinde inhale steroid ve/veya lökötrien antagonistleri ile profilaktik tedavi başlanmamalıdır?

- A) Annesi astım olan çocuk
- B) Atopik egzeması olan çocuk
- C) Prematür doğum öyküsü olan çocuk
- D) Allerjik nezlesi olan çocuk
- E) Aeroallerjen duyarlılığı olan çocuk

55. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda astım gelişimi yönünden bir risk faktörü değildir?

- A) Ebeveynlerde astım
- B) Besin allerjisi
- C) Düşük doğum ağırlığı
- D) Sigara dumanına maruziyet
- E) Kız cinsiyet

56. Aşağıdakilerden hangisi protrombotik durumlardan biri değildir?

- A) Faktör VIII eksikliği
- B) Antitrombin III eksikliği
- C) Plazminojen eksikliği
- D) Homosistinemi
- E) Protein S eksikliği

57. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde fetal hemoglobin düzeyinde artma görülmez?

- A) Fanconi aplastik anemisi
- B) Beta talasemi
- C) Hemoglobin SS hastalığı
- D) Miyelodisplastik sendrom
- E) Familial hemofagositik sendrom

58. Aşağıdaki durumlardan hangisi makrositik anemiyeye yol açmaz?

- A) Kronik hemoliz
- B) Kronik böbrek hastalığı
- C) Hipotiroidizm
- D) Fenitoin kullanımı
- E) Kronik karaciğer hastalığı

59. Aşağıdakilerden hangisi Fanconi anemisiyle ilişkili fizik muayene bulgularından biri değildir?

- A) Mikrozomi
- B) Deride hiperpigmentasyon
- C) Proptozis
- D) Hipogenitalya
- E) Kulak anomalileri

60. Homozigot hemoglobin S hastalığında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

- A) Priapizm
- B) Daktilit
- C) Akut hepatik yetmezlik
- D) Akut göğüs sendromu
- E) Renal hastalık

61. Yaşam boyu eritrosit transfüzyonu alması gereken talasemili hastalarda, hangi minör kan grubu uygunluğu aranmalıdır?

- A) Kell
- B) MNSS
- C) Lutheran
- D) Lewis
- E) P

62. Hodgkin lenfoma en sık hangi lenfatik bölgeden başlar?

- A) Aksiller
- B) İnguinal
- C) Mediastinal
- D) Servikal
- E) Abdominal

63. Aşağıdakilerden hangisi Wilms tümörü ile ilişkilidir?

- A) Beckwith-Wiedemann sendromu
- B) Familial poliposis coli
- C) Incontinentia pigmenti
- D) Wiskott-Aldrich sendromu
- E) Marfan sendromu

64. Aşağıdakilerden hangisi küçük yuvarlak hücreli malign tümörlerden biri değildir?

- A) Ewing sarkomu
- B) Nöroblastom
- C) Lenfoma
- D) Rabdomiyosarkom
- E) Germ hücreli tümörler

65. Aşağıdakilerden hangisi infratentoryal ve orta hat yerleşimli tümörlerde sıklıkla beklenen bulgulardan biri değildir?

- A) Baş ağrısı
- B) Ekzoftalmus
- C) Bulantı, kusma
- D) Diplopi
- E) Papil ödem

66. Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematозusun tanı kriterlerinden biri değildir?

- A) Diskoid raş
B) Perikardit
C) Artrit
D) Hepatit
E) Persistan proteinüri

67. On üç yaşında bir kız çocuk sağ ayak bileği, sol diz ve her iki el parmak eklemlerinde 3 aydır devam eden şişlik ve ağrı yakınmalarıyla getiriliyor. Fizik muayede sağ ayak bileği, sol diz ve her iki el distal interfalangeal eklemlerinde artrit, el tırnaklarında çukurluklar (pitting) ve onkolizis saptanıyor.

HLA-B27 negatif bulunan bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Reaktif artrit
B) Skleroderma
C) Psöriatik artrit
D) Juvenil ankilozan spondilit
E) Lyme hastalığı

68. Ailevi Akdeniz ateşi hastalığının tedavisinde kolşisin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Atak sayısını azaltır.
B) Amiloidoz gelişimi riskini azaltır.
C) Amiloidoz gelişmişse parsiyel regresyon sağlayabilir.
D) Gebelik döneminde anne için zararlı değildir.
E) Gebelik döneminde fetüs için zararlıdır.

69. Aşağıdaki metabolik asidoz nedenlerinin hangisinde anyon açığı yoktur?

- A) Diyare
B) Primer laktik asidoz
C) Diyabetik ketoasidoz
D) Böbrek yetmezliği
E) Salisilat intoksikasyonu

70. Aşağıdakilerden hangisi hiperfosfatemiyeye yol açmaz?

- A) Rabdomiyoliz
B) Vitamin D intoksikasyonu
C) Diyabetik ketoasidoz
D) Laksatif kullanımı
E) Glukokortikoid kullanımı

71. Aşağıdakilerden hangisi normovolemik hiponatremi nedenlerinden biri değildir?

- A) Desmopresin asetat kullanımı
B) Obstrüktif üropati
C) Glukokortikoid kullanımı
D) Uygunsuz antidiüretik hormon sendromu
E) Hipotiroidi

72. Aşağıdakilerden hangisi steroide dirençli nefrotik sendroma neden olan genlerden biri değildir?

- A) Polisistin
- B) Nefrin
- C) Podosin
- D) α -aktinin-4
- E) Wilms tümörü-supresör geni (WT1)

73. Aşağıdakilerden hangisi hızlı ilerleyen glomerülo-nefrit nedenlerinden biri değildir?

- A) IgA nefropatisi
- B) Sistemik lupus eritematozus
- C) İnce bazal membran hastalığı
- D) Bakteriyal endokardit
- E) Poststreptokokkal glomerülo-nefrit

74. Masif üst gastrointestinal kanama nedeniyle getirilen 10 yaşındaki kız çocukta hepatosplenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde transaminaz düzeyleri, bilirübin düzeyi, albümin düzeyi, protrombin zamanı normal olarak bulunuyor.

Bu çocuktaki kanamanın nedeni en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Otoimmün hepatit
- B) α_1 -antitripsin eksikliği
- C) Wilson hastalığı
- D) Konjenital hepatik fibrozis
- E) Koledok kisti

75. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yenidoğan kolestazına en sık neden olur?

- A) Parenteral nutrisyona bağlı kolestaz
- B) Ekstrahepatik biliyer atrezi
- C) İdyopatik neonatal hepatit
- D) Sitomegalovirus hepatiti
- E) Sepsis-endotoksemi

76. Çocuklarda sklerozan kolanjit tanısında ilk tercih edilmesi gereken yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ultrasonografi
- B) Tomografi
- C) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi
- D) Karaciğer biyopsisi
- E) Anjiyografi

77. İzoniazid hangi tip karaciğer hastalığına neden olur?

- A) Akut hepatit
- B) Kolestaz
- C) Steatoz
- D) Granülomatozis
- E) Hepatik ven trombozu

78. İnfantil kolik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kolik sırasında karın şiş ve gergindir.
- B) Çoğunlukla ilk 3 ay içinde kendiliğinden geçer.
- C) Ataklar sıklıkla öğleden sonra veya akşamları olur.
- D) Nedeni sıklıkla reflü özofajitidir.
- E) Ataklar sırasında bebek ellerini yumruk yapar ve bacaklarını karnına doğru çeker.

79. Tekrarlayan karın ağrısı olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel nedeni düşündürmelidir?

- A) Çocuğun 6 yaşından küçük olması
- B) Ağrının umbilikus çevresinde lokalize olması
- C) Ağrının gece uykudan uyandırması
- D) Dışkıda aşıkara veya gizli kan varlığı
- E) Büyümenin duraklaması

80. Aşağıdakilerden hangisi kalpte volüm artışına yol açarak kalp yetmezliğine neden olabilir?

- A) Aort stenozu
- B) Pulmoner stenoz
- C) Mitral yetmezliği
- D) Aort koarktasyonu
- E) Triküspit darlığı

81. Bir yaşın altındaki çocuklardaki supraventriküler taşikardi tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Verapamil
- B) Propranolol
- C) Prokainamid
- D) Kinidin
- E) Adenozin

82. Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde prostaglandin E₁ infüzyonuna gerek yoktur?

- A) Hipoplastik sol kalp sendromu
- B) Trunkus arteriozus tip 1
- C) Ağır aort koarktasyonu
- D) Pulmoner atrezi
- E) İzole büyük arterlerin transpozisyonu

83. Total pulmoner venöz dönüş anomalisinde pulmoner venlerin en sık açıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sol superior vena kava
- B) Koroner sinüs
- C) Sağ atrium
- D) İnförör vena kava
- E) Hepatik venler

84. Supravalvüler aort stenozu aşağıdaki sendromlardan hangisiyle ilişkilidir?

- A) Turner sendromu
- B) Down sendromu
- C) Holt-Oram sendromu
- D) Eisenmenger sendromu
- E) Williams sendromu

85. Dört aylık bir bebek solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise getiriliyor. Fizik muayenede taşikardi, takipne, sıçrayıcı nabız, interkostal retraksiyonlar, Gallop ritmi, hepatomegali ve sol klavikula altında devamlı üfürüm saptanıyor.

Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pnömoni
- B) Ventriküler septal defekt
- C) Patent duktus arteriozus
- D) Atrial septal defekt
- E) Respiratuvar distres sendromu

86. Piridoksine (vitamin B₆) yanıt veren nöbetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Beyinde GABA (γ -aminobütirik asit) eksikliği esas nedendir.
- B) Glutamik asit dekarboksilaz enzim aktivitesi yetersizdir.
- C) Hayatın ilk saatlerinde başlayan nöbetler karakteristiktir.
- D) Geç başlayan formu vardır.
- E) 3-5 mg/gün piridoksin ile nöbetler kontrol altına alınır.

87. Canavan hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Aspartoasilaz enzim eksikliği vardır.
- B) Beyinde ağır lökodistrofi yaratır.
- C) Konjenital mikosefali karakteristiktir.
- D) İdrarda ve kanda N-asetilaspartik asit atılımı vardır.
- E) Otozomal resesif geçişlidir.

88. Aşağıdakilerden hangisi obstrüktif uyku apne sendromunda beklenmez?

- A) Sabah olan baş ağrısı
- B) Düşük okul performansı
- C) Hipoaktivite
- D) Dikkat eksikliği
- E) Agresif davranışlar

89. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi çocukluk çağındaki migren profilaksisinde kullanılmaz?

- A) Triptanlar
- B) Antihistaminikler
- C) Antikonvülsanlar
- D) Antidepresanlar
- E) Kalsiyum kanal blokörleri

Diğer sayfaya geçiniz.

90. Çocukluk çağı multipl sklerozu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Çocukluk çağında multipl skleroz erişkinlere göre nadirdir.
- B) Etiyolojide genetik, immünolojik ve enfeksiyöz faktörlerin sorumlu olduğu düşünülmektedir.
- C) Aile öyküsü olguların yaklaşık beşte birinde saptanır.
- D) Bilinç bozukluğu ve ensefalopati en sık görülen bulgudur.
- E) En sık izlenen motor bozukluk tek taraflı güçsüzlük ve ataksidir.

91. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde otonomik nöropati **gelişmez**?

- A) Botulizm
- B) Lepra
- C) Difteri
- D) Dermatomiyoit
- E) Sistemik lupus eritematozus

92. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu eksikliğine bağlı boy kısalığının özelliklerinden biri **değildir**?

- A) Kemik yaşlarının geri olması
- B) Büyüme eğrilerine paralel büyümeleri
- C) Boydaki sapmaların -3 den fazla olması
- D) Yıllık büyüme hızlarının düşük olması
- E) Genetik boylarına göre de kısa olmaları

93. Bacaklarında eğrilik şikâyetiyle getirilen 3 yaşında bir erkek çocuğun laboratuvar incelemelerinde serum kalsiyum düzeyi normal, serum fosfor düzeyi düşük, alkalen fosfataz düzeyi yüksek olarak bulunuyor; idrar amino asitlerinde artış saptanmıyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vitamin D ye bağımlı tip 2 raşitizm
- B) Vitamin D eksikliğine bağılı raşitizm
- C) Primer hipofosfatemik raşitizm
- D) Hipofosfatazya
- E) Jansen tipi metafizyal dizostoz

94. İntrauterin yaşamda testisteki sertoli hücrelerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Testosteron salgılaması
- B) Wolf yapılarını geliştirmesi
- C) Genital köprünün virilize olmasından sorumlu olması
- D) Antimüllerian hormon salgılaması
- E) Leydig hücrelerinin gelişiminden sorumlu olması

95. Karyotipi 46,XY, gonadları testis, dış genitelyası kız görümlü olan bir bebek için **en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Komplet androjen rezistansı
- B) 21-hidroksilaz eksikliği
- C) Aromataz eksikliği
- D) Gebelik luteoması
- E) Annede gebelikte androjen salgılayan tümör varlığı

96. Beş yaşında bir erkek çocukta makrogenitalya, somatik gelişimde hızlanma gibi bulgular olmaksızın bilateral testislerde büyüme saptanmıştır.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) McCune-Albright sendromu
- B) Primer hipotiroidi
- C) Testotoksikozis
- D) Tuber cinerium hamartomu
- E) Hepatik β -hCG salgılayan tümör

97. Altı yaşında bir erkek çocukta yapılan muayenede boy yaşı 10, kemik yaşı 12, testis volümleri 2/2 ml, penil boyu 9 cm ile 95. percentilde ve Tanner evre 3 pubik kıllanma saptanmıştır.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yalancı heteroseksüel erken ergenlik
- B) Normal ergenlik
- C) Gerçek erken ergenlik
- D) Yalancı izoseksüel erken ergenlik
- E) Prematür adrenarş

98. Premenstrüel gerginlikte semptomlar menstrüasyonun hangi fazında görülür?

- A) Foliküler faz
- B) Ovulasyon fazı
- C) Luteal faz
- D) Sekretuar faz
- E) Menstrüel faz

99. Kız adolesanlarda en sık görülen meme kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Meme teratomu
- B) Fibroadenom
- C) İntraduktal papillom
- D) Meme karsinomu
- E) Meme apsisi

100. Polikistik over sendromu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Pubertede ortaya çıkar.
- B) Saç kaybına neden olabilir.
- C) Akne görülebilir.
- D) Obezite ile birlikte olabilir.
- E) Aile öyküsü yoktur.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. 2010-YDUS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. **Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayar, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açılışer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi **150 dakikadır (2,5 saat)**. Sınavın ilk **75** ve son **15** dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. **Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.** Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. **Cevap kâğıdınızı** başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir.
6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. **Cevap kâğıdında** ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. **Cevap kâğıdına** yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.

Cevapların **cevap kâğıdına** işaretlenmiş olması gerekir. **Soru kitapçığına** işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. **Soru kitapçığınızı** alırsınız, sayfaların eksik olup olmadığını, **kitapçıkta** basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.
9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek **soru kitapçığı** üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda **soru kitapçıkları ile cevap kâğıtları** toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. **Soru kitapçığının** bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. **Soru kitapçıklarının** sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
11. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
12. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı, 2010-YDUS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS)

23 MAYIS 2010

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 1. C | 26. B | 51. B | 76. C |
| 2. A | 27. İPTAL | 52. E | 77. A |
| 3. E | 28. D | 53. A | 78. D |
| 4. D | 29. C | 54. C | 79. B |
| 5. D | 30. A | 55. E | 80. C |
| 6. İPTAL | 31. C | 56. A | 81. E |
| 7. A | 32. E | 57. E | 82. B |
| 8. D | 33. C | 58. B | 83. A |
| 9. E | 34. D | 59. C | 84. E |
| 10. B | 35. A | 60. C | 85. C |
| 11. A | 36. C | 61. A | 86. E |
| 12. C | 37. B | 62. D | 87. C |
| 13. D | 38. D | 63. A | 88. C |
| 14. B | 39. E | 64. E | 89. A |
| 15. E | 40. A | 65. B | 90. D |
| 16. C | 41. C | 66. D | 91. D |
| 17. B | 42. A | 67. C | 92. B |
| 18. C | 43. E | 68. E | 93. C |
| 19. E | 44. B | 69. A | 94. D |
| 20. A | 45. E | 70. E | 95. A |
| 21. B | 46. A | 71. İPTAL | 96. B |
| 22. E | 47. B | 72. A | 97. D |
| 23. D | 48. D | 73. C | 98. C |
| 24. E | 49. C | 74. D | 99. B |
| 25. A | 50. D | 75. İPTAL | 100. E |