



YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN
SEVİYE TESPİT SINAVI
TIP DOKTORLUĞU
2. AŞAMA

3 Temmuz 2011

A

ADI :
SOYADI :
T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI :
SALON NUMARASI :

GENEL AÇIKLAMA

1. Bu testte 100 soru vardır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi **120 dakikadır (2 saat)**.
3. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır.
4. Bu soru kitapçığının türü **A**'dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
5. Testteki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
8. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
9. **Bu sınavdaki sorulara verdiğiniz cevaplar puanlanırken her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.** Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Soru kitapçığının sayfalarında uygun gördüğünüz boşlukları müsvedde için kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

2. AŞAMA KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

2011 – STS 2. Aşama / Tıp

1. Presistolik (geç diyastolik) üfürüm ile birlikte 1. sesin sert duyulması aşağıdaki hastalıkların hangisi için karakteristik oskültasyon bulgusudur?

- A) Aort yetmezliği B) Mitral darlığı
C) Aort darlığı D) Aort koarktasyonu
E) Mitral yetmezliği

2. Atletizm yarışmasında ani baygınlık geçiren 18 yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde S4 ile birlikte tüm prekordiyumda duyulan apekse yayılan sert sistolik ejeksiyon üfürümü duyuluyor. Üfürümün şiddeti özellikle hasta bacaklarını kaldırıncaya ve çömelince azalıyor.

Erkek kardeşi 20'li yaşlarda futbol oynarken aniden ölen bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Restriktif kardiyomyopati
B) Konstriktif perikardit
C) Mitral darlığı
D) Hipertrofik kardiyomyopati
E) Koroner arter anomalisi

3. Aşağıdakilerden hangisi 55 yaşında bir erkek için metabolik sendrom tanısı konulması açısından bir risk faktörü değildir?

- A) Bel çevresi >102 cm
B) Serum trigliserit düzeyi >150 mg/dL
C) Serum HDL kolesterol düzeyi >40 mg/dL
D) Kan basıncı \geq 130 / 85 mmHg
E) Açlık serum glukoz düzeyi >110 mg/dL

4. Sağlıklı erişkinlerde toplumda gelişen alt solunum yolu enfeksiyonlarında en sık rastlanan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oral anaeroblar
B) Legionella pneumophila
C) Haemophilus influenzae
D) Streptococcus pneumoniae
E) Pseudomonas aeruginosa

5. Aşağıdaki plevral sıvı değerlerinden hangisi eksuda tipi sıvı ile uyumlu değildir?

- A) Plevral sıvı proteini / serum proteini >0,5
B) Plevral sıvıda Gram(+) kok görülmesi
C) Plevral sıvı LDH düzeyi / Serum LDH düzeyi >0,6
D) Plevral sıvı LDH'sinin serum LDH üst sınırının 2/3'ünden yüksek olması
E) Serum protein düzeyi – plevral sıvı protein düzeyi farkının >3,1 g/dL olması

Diğer sayfaya geçiniz.

6. Aşağıdakilerden hangisi obstrüktif uyku apnesinin yol açtığı klinik sonuçlardan biri değildir?

- A) Libido azalması
- B) Depresyon
- C) Sistemik hipertansiyon
- D) İnsülin direnci
- E) Kronik böbrek yetmezliği

7. Aşağıdaki pnömoni etkenlerinden hangisinin neden olduğu enfeksiyonda idrarda antijen aranması tanıda değerlidir?

- A) Legionella pneumophila
- B) Staphylococcus aureus
- C) Klebsiella pneumoniae
- D) Chlamydia pneumoniae
- E) Coxiella burnetii

8. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi tek başına verildiğinde renal dehidropeptidaz-1 tarafından parçalanarak etkisiz kalır?

- A) İmipenem
- B) Seftazidim
- C) Ampisilin
- D) Sefoperazon
- E) Rifampin

9. Akut bruselloz olgularında bakteriyolojik doğrulamanın yapılamadığı durumlarda, bruselloz ile uyumlu klinik bulguların varlığında standart tüp aglütinasyonu titresinin kaç olması tanı koydurur?

- A) 1/10
- B) 1/20
- C) 1/40
- D) 1/80
- E) 1/160

10. Aşağıdakilerden hangisi sirotik bir hastada hepatik ensefalopatiye yol açan nedenler arasında değildir?

- A) Son günlerde aşırı protein tüketimi
- B) Kan basıncında aşırı yükselme
- C) Melena ve/veya hematemez
- D) Elektrolit bozukluğu
- E) Yakın zamanda geçirilmiş herhangi bir enfeksiyon

Diğer sayfaya geçiniz.

11. Primer sklerozan kolanjit aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile en sık birliktelik gösterir?

- A) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
- B) Whipple hastalığı
- C) Sarkoidoz
- D) Romatoid artrit
- E) Çölyak hastalığı

12. Aşağıdaki faktörlerden hangisi alt özofagus sfinkterinin yetersizliğine neden olan sekonder faktörlerden biri değildir?

- A) Skleroderma
- B) Gebelik
- C) Sigara kullanımı
- D) Helicobacter pylori'ye bağlı antral gastrit
- E) Kalsiyum kanal blokörü kullanımı

13. Aşağıdakilerden hangisi radyokontrast nefrotoksisitesi gelişme riskini artıran bir durum değildir?

- A) Hiperkalemi
- B) İleri yaş
- C) Multipl miyelom
- D) Diabetes mellitus
- E) Böbrek yetmezliği

14. Hiponatremi ile birlikte seyreden aşağıdaki durumların hangisinde hasta normovolemiktir?

- A) Uygunsuz ADH sendromu
- B) Diabetes insipidus
- C) Konjestif kalp yetmezliği
- D) Ciddi diyare
- E) Nefrotik sendrom

15. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi osteoporoz riskinde artışa neden olmaz?

- A) Antikonvülsanlar
- B) Heparin
- C) Tiroksin
- D) Tamoksifen
- E) Siklosporin

16. Üç aydır çok su içme, çok idrara çıkma şikâyetleri olan ve açlık kan glukozu 176 mg/dL bulunan 50 yaşındaki bir kadın hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünümez?

- A) Diabetes mellitus
- B) Cushing sendromu
- C) İnsülinoma
- D) Glukagonoma
- E) Somatostatinoma

17. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hiperprolaktinemiye neden olmaz?

- A) Verapamil
- B) Anti-HIV proteaz inhibitörleri
- C) Klorpromazin
- D) Metoklopramid
- E) Bromokriptin

18. Akut gut artritinin tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi etkili değildir?

- A) Kolşisin
- B) Allopürinol
- C) İndometazin
- D) Prednizolon
- E) Diklofenak

19. Aşağıdaki vaskülitlerden hangisinin c-ANCA ile ilişkisi en yüksektir?

- A) Behçet hastalığı
- B) Poliarteritis nodosa
- C) Kawasaki hastalığı
- D) Wegener granülomatozu
- E) Takayasu arteriti

20. Megaloblastik anemide aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- A) Normal serum metilmalonik asit düzeyi
- B) Hipersegmenter kemik iliği
- C) Trombositopeni
- D) Periferik yaymada nötrofillerde hipersegmentasyon
- E) Hiperhomosisteinemi

Diğer sayfaya geçiniz.

21. Trombosit sayısı $140.000/\text{mm}^3$ ve periferik yaymada dev trombositler gözlenen bir hastada kanama zamanı 10 dakika olarak ölçülmüştür.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) von Willebrand hastalığı
- B) Glanzmann trombastenisi
- C) Bernard-Soulier sendromu
- D) Hermansky-Pudlak sendromu
- E) Chediak-Higashi sendromu

22. Altmış iki yaşında bir erkek hastada yapılan rutin kontroller sırasında lökosit sayısı $36.000/\text{mm}^3$ olarak, periferik yaymada ise % 92 oranında olgun görünümlü lenfositler saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hodgkin lenfoma
- B) Kronik lenfositik lösemi
- C) Akut sitomegalovirus enfeksiyonu
- D) Akut lenfoblastik lösemi
- E) Miyelodisplastik sendrom

23. İnsan Herpes virus tip 8 aşağıdaki kanserlerden hangisinin etiopatogenezinden sorumludur?

- A) Hodgkin hastalığı
- B) Primer renal hücreli karsinom
- C) Kaposi sarkomu
- D) Mide kanseri
- E) Mesane kanseri

24. Torasik çıkış sendromunda aşağıdaki sinir yapılarından hangisine baskı vardır?

- A) Median sinir
- B) Brachial pleksus
- C) Ulnar sinir
- D) Aksiller sinir
- E) Uzun torasik sinir

25. Altmış yaşında erkek hasta 1 hafta önce geçirdiği gribal enfeksiyonun ardından ani başlayan çift görme, sağda belirgin her iki göz kapağında düşme, konuşma bozukluğu ve yutma güçlüğü gelişmesi nedeniyle başvuruyor. Muayenede asimetrik bilateral ptoz, eksternal oftalmoparezi ve nazone konuşma saptanıyor.

Ekstremitte kas gücü ve derin tendon refleksleri normal olan bu hastada ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Guillain-Barré sendromu
- B) Botulizm
- C) Beyin sapı tümörü
- D) Lambert-Eaton sendromu
- E) Miyastenia gravis

Diğer sayfaya geçiniz.

26. Aşağıdakilerden hangisi Parkinson hastalığının motor bulgularından biri değildir?

- A) Ortostatik hipotansiyon B) Rijidite
C) İstirahat tremoru D) Bradikinezi
E) Sialore

27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çocukluk çağında uygulanan rutin aşı takviminde yer almaz?

- A) Oral polio aşısı
B) Konjuge pnömokok aşısı
C) Tifo aşısı
D) BCG aşısı
E) Hepatit B aşısı

28. Aşağıdaki durumların hangisinde VDRL testi yalancı pozitiflik göstermez?

- A) Sistemik lupus eritematozus
B) Lepra
C) HIV enfeksiyonu
D) Damar içi ilaç bağımlılığı
E) Psöriazis

29. Aşağıdakilerden hangisi anoreksia nervozanın tanı kriterleri arasında yer alan tıbbi komplikasyonlardan biridir?

- A) Serum T₃ düzeyinde düşme
B) Uzamış QT intervali
C) Hipokalemik alkaloz
D) Amenore
E) Lökopeni

30. Aşağıdakilerden hangisinin primer akciğer tüberkülozlu bir hastanın direkt grafisinde saptanma olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür?

- A) Lober veya segmenter konsolidasyon
B) Volüm kaybı
C) Milier infiltrasyon
D) Plevral efüzyon
E) Hiler lenfadenopatiler

Diğer sayfaya geçiniz.

31. İki aylık bir bebeğin büyüme ve gelişmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Eline çingirak verildiğinde tutup sallayabilir.
- B) "Ba-ba", "da-da" gibi heceler söyleyebilir.
- C) Ağırlığı doğum ağırlığının iki katına ulaşmış olmalıdır.
- D) Yüz üstü yatarken kollarına dayanıp başını ve gövdesinin üst kısmını 45° kaldırabilir.
- E) Göz teması kurup kendisine gülümseyen birine karşılık verebilir.

32. Aşağıdakilerden hangisi osmotik diyareye neden olmaz?

- A) Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu
- B) Disakkaridaz eksikliği
- C) Laktuloz alımı
- D) Yersinia enterocolitica toksini
- E) Aşırı absorbe olmayan solüt alımı

33. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan menenjitinin geç komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Dissemine intravasküler koagülasyon
- B) İşitme kaybı
- C) Serebral palsi
- D) Beyin apsesi
- E) Konvülsiyonlar

34. Yenidoğanlarda anne sütü sarılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Term yenidoğanların yaklaşık % 20'sinde yaşamın ilk ayından sonra ortaya çıkar.
- B) İndirekt bilirübin düzeyi 10-30 mg/dL'ye kadar çıkabilir.
- C) Anne sütü ile beslenme 1-2 gün kesilirse, serum indirekt bilirübin düzeyi hızla düşer.
- D) Bu bebeklerde kernikterus seyrek görülür.
- E) Etiyolojide anne sütündeki glukuronidaz enziminin rolü olabilir.

35. Aşağıdakilerden hangisinin prematüre bir yenidoğanda görülmesi beklenmez?

- A) Apne
- B) Persistan pulmoner hipertansiyon
- C) Periventriküler lökomalazi
- D) Bronkopulmoner displazi
- E) Hipotermi

Diğer sayfaya geçiniz.

36. İntrauterin dönemde polihidramnios tanısı ile izlenen bebekte aşağıdakilerden hangisi düşünülmaz?

- A) Trakeoözofageal fistül
- B) Nöral tüp defekti
- C) Duodenal atrezi
- D) Renal agenezi
- E) Annede diabetes mellitus

37. Fenilketonüri tanısı konan bebeklerde aşağıdakilerden hangisine mutlaka bakılmalıdır?

- A) Fanconi sendromu
- B) Hipotiroidi
- C) Tetrahydrobiopterin eksikliği
- D) Sistinozis
- E) Propiyonik asidemi

38. Tip 1 tirozinemi tanısında en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kanda tirozin yüksekliği
- B) Kanda veya idrarda süksinilaseton pozitifliği
- C) Kanda metionin yüksekliği
- D) Kanda α -fetoprotein yüksekliği
- E) İdrarda tirozin yüksekliği

39. Supravalvüler aort stenozu olan bir çocukta aşağıdaki sendromlardan hangisi düşünülebilir?

- A) Williams sendromu
- B) Down sendromu
- C) Noonan sendromu
- D) Alagille sendromu
- E) Kartagener sendromu

40. Fallot tetralojili bir hastada en sık görülen klinik tablo aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Genellikle asemptomatik
- B) Hipoksik nöbet
- C) Konjestif kalp yetersizliği
- D) Göğüs ağrısı
- E) Yüksek ateş

41. Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin majör bulgularından biri değildir?

- A) Poliartrit
B) Kardit
C) Sydenham koresi
D) Deri altı nodülleri
E) Eritema nodosum

42. Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenidir?

- A) Hiperparatiroidi
B) DiGeorge sendromu
C) Hipermağnezemi
D) Vitamin D intoksikasyonu
E) Sarkoidoz

43. Meningokoksemi nedeniyle tedavi edilirken sıvı ve katekolamin tedavisine rağmen şoktan çıkamayan 6 aylık bir kız bebekte hangi organda disfonksiyon olduğu düşünülmalıdır?

- A) Sürenal
B) Böbrek
C) Karaciğer
D) Pankreas
E) Akciğer

44. Aşağıdakilerden hangisi kızamıkçığın komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Artrit
B) Ensefalit
C) Guillain-Barré sendromu
D) Orşit
E) Trombositopeni

45. İmmün yetmezliği olmayan çocuklarda kronik ishale yol açabilen paraziter enfeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Isospora belli
B) Ascaris lumbricoides
C) Giardia lamblia
D) Taenia saginata
E) Taenia solium

46. Çölyak hastalığında en sık görülen semptom aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kusma
B) Karın ağrısı
C) Solukluk
D) İritabilite
E) Diyare

47. Bir günlük erkek bebek safralı kusma ve karında distansiyon gelişmesi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Çekilen direkt karın grafisinde çift baloncuk saptanıyor.

Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İleal atrezi
B) Duodenal atrezi
C) Volvulus
D) İnvajinasyon
E) Pilor stenozu

48. Aşağıdakilerden hangisi hiperpotasemi tedavisinde kullanılmaz?

- A) Kayeksalat
B) Kalsiyum glukonat
C) Alüminyum hidroksit
D) İnsülin+glukoz içeren sıvı
E) Sodyum bikarbonat

49. Aşağıdaki testlerden hangisi sistemik lupus eritematozus tanısı koymada yardımcı değildir?

- A) Anti-dsDNA
B) Anti-Sm antikorlar
C) C reaktif protein
D) C3 (Kompleman 3)
E) Antinükleer antikor

50. Kronik granülomatöz hastalıkta aşağıdakilerden hangisi sıklıkla görülen enfeksiyon nedenlerinden biri değildir?

- A) Sitomegalovirus
B) Staphylococcus aureus
C) Candida albicans
D) Aspergillus
E) Salmonella

Diğer sayfaya geçiniz.

51. Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozis bulgusu değildir?

- A) Kronik öksürük
- B) Mekonyum ileusu
- C) Diabetes insipidus
- D) Solunum yolu enfeksiyonları
- E) Malabsorpsiyon ve yağlı dışkı

52. Aşağıdakilerden hangisinin yapımında vitamin K'ya gereksinim yoktur?

- A) Faktör II
- B) Faktör VII
- C) Faktör IX
- D) Faktör X
- E) Faktör XI

53. Aşağıdakilerden hangisi orak hücreli anemide, hayatın ilk beş yılında gelişen komplikasyonlardan biri değildir?

- A) Splenik sekestrasyon
- B) Aplastik kriz
- C) Akut göğüs sendromu
- D) Priapizm
- E) Vazo-oklüzif kriz

54. Aşağıdaki anemilerden hangisi mikrositik değildir?

- A) Demir eksikliği anemisi
- B) Transkobalamin eksikliği
- C) Bakır eksikliği
- D) Talasemi
- E) Sideroblastik anemi

55. Aşağıdakilerden hangisi retinoblastoma tanısında değerli bir bulgudur?

- A) Lökokori (beyaz pupilla)
- B) Deri altı nodülleri
- C) Panda gözü bulgusu
- D) Peteşi, ekimoz
- E) Yüz felci

Diğer sayfaya geçiniz.

56. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanımı akut miyeloid lösemi gelişmesi için en yüksek riskli oluşturur?

- A) Vinka alkaloidleri B) Steroidler
C) Epipodofilotoksinler D) Antimetabolitler
E) Platinler

57. Aşağıdakilerden hangisi Duchenne musküler distrofi için karakteristiktir?

- A) Kernig belirtisi B) Gowers belirtisi
C) Papil ödemi D) Babinski pozitifliği
E) Miyotonik reaksiyon

58. İntrakranial basınç artışının en erken bulgusu sıklıkla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Baş ağrısı
B) İşitme kaybı
C) Kulak çınlaması
D) Ekstremitelerde güçsüzlük
E) Göz kapaklarında düşüklük

59. Mikroftalmi, iris kolobomu, holoprozansfali, yarı dudak ve damak, polidaktili, konjenital kalp defekti ve polikistik böbrek saptanan bir çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trisomi 5 B) Trisomi 8 C) Trisomi 13
D) Trisomi 18 E) Trisomi 21

60. Aşağıdakilerden hangisi otozomal dominant kalıtılan hastalıklardan biridir?

- A) Talasemi B) Kistik fibrozis
C) Tay-Sachs hastalığı D) Nörofibromatozis
E) Fanconi anemisi

61. Ameliyat sonrası ilk 48 saatte görülen ateşin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yara enfeksiyonu B) Atelektazi
C) Üriner enfeksiyon D) Akut tromboflebit
E) Akciğer embolisi

62. Aşağıdaki durumlardan hangisi bikarbonat atılımının bozulmasına bağlı metabolik alkalozdan sorumludur?

- A) İdrarda klorür atılımının 20 mEq/L'nin üzerinde olması
B) Masif kan transfüzyonu
C) Gastrik sıvı ile klor kaybı
D) Aldosteron fazlalığı
E) Glomerüler filtrasyon azlığı

63. Aşağıdakilerin hangisinde T dalgalarında sivrileşme, uzamış PR intervalı, geniş QRS ve ventriküler ektopik atımlar gözlenir?

- A) Hiperkalsemi B) Hipermagnezemi
C) Hiperkalemi D) Hipernatremi
E) Hiperfosfatemi

64. Penetran karın yaralanmalarında, en sık yaralanan organ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karaciğer B) Mide C) Kalın bağırsak
D) İnce bağırsak E) Böbrek

65. Rotter lenf nodülleri vücudun hangi bölgesinde bulunur?

- A) Boyun B) İnguinal C) Aksilla
D) Retroperitoneal E) Mediasten

66. Karın ön yüzündeki delici-kesici alet yaralanmasında aşağıdaki tanısal peritoneal lavaj bulgularından hangisi pozitif olarak kabul edilir?

- A) Eritrosit sayısı 10.000/ml
B) Lökosit sayısı 1000/ml
C) Amilaz düzeyi 10 IU/L
D) Alkalen fosfataz düzeyi 1,5 IU/L
E) Bilirübin düzeyi 0,005 mg/dL

Diğer sayfaya geçiniz.

67. Akut böbrek yetmezliğinde aşağıdaki elektrolit bozukluklarından hangisinin görülme olasılığı en düşüktür?

- A) Hipokalsemi B) Hiperkalemi
C) Hiponatremi D) Hipomagnezemi
E) Hiperfosfatemi

68. Kuadrat lob (segment 4) karaciğerin hangi segmentini tanımlar?

- A) Sol anterior lateral segment
B) Sol posterior lateral segment
C) Sol medial segment
D) Sağ posterior lateral segment
E) Sağ anterior medial segment

69. Memenin intraduktal papillomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kanlı meme başı akıntısı yapabilirler.
B) Multipl olabilirler.
C) Düşük oranda kitle şeklinde palpe edilebilirler.
D) Tedavide duktus ile birlikte eksizyon uygulanır.
E) Yüksek malignite riski taşırlar.

70. Tüm meme kanserli kadınların yaklaşık yüzde kaçında genetik faktörlerin etken olduğu tahmin edilmektedir?

- A) 5 – 10 B) 15 – 20 C) 25 – 35
D) 45 – 55 E) 65 – 75

71. Aşağıdakilerden hangisi iyi diferansiye tiroid kanserleri için prognostik açıdan yüksek risk taşır?

- A) Hastanın erkek olması
B) Hastanın 40 yaşın altında olması
C) Tümörün metastaz yapmamış olması
D) Tümörün 2 cm'den küçük olması
E) Tümörün intratiroidal olması

72. Feokromositoma tanısı konulmasında en duyarlı ve özgül test aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İdrar vanililmandelik asit (VMA) düzeyi
- B) Fraksiyone idrar katekolamin düzeyi
- C) Klonidin supresyon testi
- D) Kromogranin A
- E) Plazma ve idrar metanefrin düzeyleri

74. Barrett özofagusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Tanısı endoskopi ve biyopsi ile konulur.
- B) Özofagus kanseri gelişme riski 40 kat artmıştır.
- C) Bir yılda hastaların % 10'unda kanser oluşur.
- D) Hastaların % 70'inden fazlası erkektir.
- E) Oluşumunda yetersiz alt özofagus sfinkteri varlığı önemli rol oynar.

75. Aşağıdaki erken mide kanseri tiplerinin hangisi polipoid biçimdedir?

- A) Tip I
- B) Tip IIa
- C) Tip IIb
- D) Tip IIc
- E) Tip III

73. Kronik anemi, oral mukozada atrofi, disfaji ve özofagusta darlık ile karakterize sendrom aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mallory-Weiss sendromu
- B) Plummer-Vinson sendromu
- C) Turcot sendromu
- D) Zollinger-Ellison sendromu
- E) Cronkite-Canada sendromu

76. Bilirubin değerleri 10 mg/dL üzerinde ve muayenesinde safra kesesi hidropik (palpabl) olan hastalarda aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) Klatskin tümörü
- B) İntrahepatik taş
- C) Sistik kanalda taş
- D) Koledok distal tümörü
- E) İntrahepatik kolanjiyokarsinom

Diğer sayfaya geçiniz.

77. Tam (komplet) intestinal tıkanmaların tanısında kullanılan aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisinin duyarlılığı ve özgüllüğü en yüksektir?

- A) Bilgisayarlı tomografi
- B) Direkt karın grafisi
- C) Abdominal ultrasonografi
- D) İnce bağırsak pasaj grafisi
- E) Kolon grafisi

78. Kolon kanseri gelişiminde normal epitelin displastik epitele dönüşümünü hangi gen mutasyonu başlatır?

- A) p53
- B) K-ras
- C) DCC
- D) APC
- E) hMSH2

79. Aşağıdaki perianal fistül tiplerinden hangisi en sık görülür?

- A) Trans-sfinkterik fistül
- B) Suprasfinkterik fistül
- C) Ekstrasfinkterik fistül
- D) Suprlevator fistül
- E) İntersfinkterik fistül

80. Tarsal tünel sendromunda aşağıdaki sinirlerden hangisi sıkışır?

- A) N. suralis
- B) N. peroneus superficialis
- C) N. peroneus profundus
- D) N. saphenous
- E) N. tibialis

81. Dehidre kalan konjenital nefrotik sendromlu bir infanтта karında kitle, makroskopik hematüri ve trombositopeni saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünölmelidir?

- A) Glomerölokistik böbrek
- B) Medüller kistik böbrek
- C) Renal ven trombozu
- D) Akut glomerülo nefrit
- E) Renal tübüler asidoz

82. Çocukluk çağında gözlenen spontan subaraknoid kanamanın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Menenjit
- B) Araknoid kist
- C) Travma
- D) Arteriovenöz malformasyon
- E) Tümör

83. Orbita tabanı çökme (Blow-out) kırığında aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- A) Diplopi
- B) Nistagmus
- C) Enoftalmi
- D) İnfraorbital sinir dermatomunda anestezi
- E) Subkonjunktival kanama

84. Warthin tümörü (papiller kistadenolenfomatozum) en sık hangi tükürük bezinde görülür?

- A) Parotis tükürük bezi
- B) Submandibüler tükürük bezi
- C) Sublingual tükürük bezi
- D) Dudak minör tükürük bezi
- E) Damak minör tükürük bezi

85. En sık görülen malign mesane tümör tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yassı hücreli tümör
- B) Çok katlı değişici epitel tümörü
- C) Adenokanser
- D) Küçük hücreli tümör
- E) Papillom

86. Doğum eylemi sürecinde verteksin pelvik girim düzlemini geçmesi için özellikle hangi kardinal hareketi yapması gerekir?

- A) Dış rotasyon
- B) İç rotasyon
- C) Fleksiyon
- D) Ekstansiyon
- E) Angajman

87. Aşağıdakilerden hangisi ablasyo plasenta için en yüksek risk faktörüdür?

- A) İleri anne yaşı B) Multiparite
C) Polihidramnios D) Ablasyo öyküsü
E) Uterin fibroid

88. Gebelikte koagülasyon ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde artış gözlenmez?

- A) Trombosit sayısı B) Plazminojen %
C) Fibrinojen düzeyi D) Faktör VII düzeyi
E) Faktör X %

89. Enfekte gebenin vajinal doğum yapması durumunda en sık neonatal oftalmi nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnsan immün yetmezlik virusu (HIV)
B) Sifiliz
C) Şankroid
D) İnsan Papilloma virus
E) Chlamydia trachomatis

90. İntrauterin asfiksidede en son etkilenen biyofizik skorlama parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tonus B) Solunum
C) Hareket D) Amniotik sıvı hacmi
E) Nonstres test

91. Viral enfeksiyonlara bağlı fetal ölüm nedenlerinden en sık görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sitomegalovirus
B) Parvovirus B19
C) Coxsackie A ve B virus
D) Varisella
E) Rubella

92. Primer amenorenin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 45,X
- B) 46,XX gonadal disgenezi
- C) 45,XX / 46,XX gonadal disgenezi
- D) Swyer sendromu
- E) 45,X / 46,XY gonadal disgenezi

93. Kuadrivalan İnsan Papilloma virus aşısında aşağıdaki canlı virus partiküllerinden hangisi bulunmaz?

- A) 6
- B) 11
- C) 16
- D) 18
- E) 31

94. Yolk sak tümörü olarak da bilinen germ hücreli tümör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endodermal sinüs tümörü
- B) Embriyonal karsinom
- C) Poliembriyoma
- D) Koryokarsinom
- E) Disgerminom

95. Aşağıdaki genital bölgelerin hangisinde görülen kanserlerin evrenmesinde, evre 0, in situ kanser kavramı kullanılmaz?

- A) Vajina
- B) Serviks
- C) Endometriyum
- D) Fallop tüpleri
- E) Vulva

96. FIGO evreleme sistemine göre, primer over kanseri olgularında fallop tüpü tutulumu varsa, hastanın evresi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Evre Ib
- B) Evre Ic
- C) Evre IIa
- D) Evre IIb
- E) Evre IIIa

Diğer sayfaya geçiniz.

97. Over rezervinin saptanmasında, aşağıdakilerden hangisinin ölçümü menstrüel siklus gününden bağımsızdır?

- A) Folikül stimüle edici hormon
- B) Östradiol
- C) Antral folikül sayısı
- D) Antimüllerian hormon
- E) İnhibin B

99. Aşağıdakilerden hangisi postkoital kontrasepsiyon için etkisizdir?

- A) Tek başına progestin
- B) Östrojen / progestin kombinasyonu
- C) Bakırlı intrauterin araç
- D) Misoprostol
- E) Mifepriston

98. Aşağıdaki durumların hangisinde ekzojen gonadotropin tedavisinin yeri yoktur?

- A) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) grup I amenore
- B) Hipergonadotropik hipogonadizm
- C) Açıklanamayan infertilitede ampirik kullanım
- D) Klomifen sitrata dirençli polikistik over sendromu
- E) Erkeklerde hipogonadotropik azospermi

100. Aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisinin başarısızlığı durumunda oluşan gebeliğin ektopik yerleşimli olma olasılığı en düşüktür?

- A) Diyafram
- B) Progestinli intrauterin araç
- C) Tek başına progestinli oral kontraseptif hap
- D) Norplant
- E) Tüp ligasyonu

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

- 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayar, kol ya da cep saati gibi, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Sınava kalem, silgi, kalemtraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşyayla girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.**
2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi **120 dakikadır.** Sınav başladıktan sonra **ilk 90 ve son 15 dakika** içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.
3. **Sınav evrakını teslim ederek salondan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.**
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olduğunda durumunuz Sınav Salon Tutanağında belirtilecektir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŐI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĐİ
İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI (2. AŐAMA)

3 TEMMUZ 2011

2011-STS TIP DOKTORLUĐU 2. AŐAMA

A FORMU

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1. B | 26. A | 51. C | 76. D |
| 2. D | 27. C | 52. E | 77. A |
| 3. C | 28. E | 53. D | 78. D |
| 4. D | 29. D | 54. B | 79. E |
| 5. E | 30. B | 55. A | 80. E |
| 6. E | 31. E | 56. C | 81. C |
| 7. A | 32. D | 57. B | 82. D |
| 8. A | 33. A | 58. A | 83. B |
| 9. E | 34. A | 59. C | 84. A |
| 10. B | 35. B | 60. D | 85. B |
| 11. A | 36. D | 61. B | 86. C |
| 12. D | 37. C | 62. E | 87. D |
| 13. A | 38. B | 63. C | 88. A |
| 14. A | 39. A | 64. D | 89. E |
| 15. D | 40. B | 65. C | 90. A |
| 16. C | 41. E | 66. B | 91. B |
| 17. E | 42. B | 67. D | 92. A |
| 18. B | 43. A | 68. C | 93. E |
| 19. D | 44. D | 69. E | 94. A |
| 20. A | 45. C | 70. A | 95. C |
| 21. C | 46. E | 71. A | 96. C |
| 22. B | 47. B | 72. E | 97. D |
| 23. C | 48. C | 73. B | 98. B |
| 24. B | 49. C | 74. C | 99. D |
| 25. E | 50. A | 75. A | 100. A |